

Sulfarlem[®] 12,5 mg

comprimé enrobé
anétholtrithione

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

Composition :

Par comprimé enrobé :

Anétholtrithione.....12,5 mg

Excipients : lactose, gomme arabique, amidon de blé, saccharose, gomme guar, silice colloïdale hydratée, stéarate de magnésium, gélatine, talc, dioxyde de titane (E171), jaune orangé S (E110), cire de carnauba.

Forme pharmaceutique :

Comprimé enrobé, boîte de 60.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Stimulant de la fonction biliaire.

Titulaire - Exploitant :

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics - «Le Quintet» - Bâtiment A - 12 rue Danjou
92517 BOULOGNE-BILLAN COURT Cedex

Fabricant :

DELPHARM REIMS - 10, rue Colonel Charbonneaux - 51100 REIMS

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament est préconisé en cas de digestion difficile, en cas de bouche sèche (sécrétion de salive insuffisante).

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies biliaires.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi :

En cas de calculs de la vésicule biliaire, prévenir votre médecin.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Excipients à effet notoire : lactose, amidon de blé, saccharose, jaune orangé S (E110).

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie :

Adulte : 1 à 2 comprimés, 3 fois par jour.

Enfant : de 10 à 15 ans : 1 comprimé 3 fois par jour,

de 6 à 10 ans : 1 comprimé 2 fois par jour,

au dessous de 6 ans : consulter votre médecin.

Dans tous les cas se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

Prendre les comprimés environ une demi-heure avant les repas.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS :

(EFFETS INDÉSIRABLES)

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : parfois, ramollissement des selles avec tendance diarrhéique.

La coloration plus foncée des urines est un phénomène normal qui ne doit pas inquiéter.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien, tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

DATE DE RÉVISION : Juin 2005.

Ceci est un médicament.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.