



Cystine B6 Bailleul

20, 60 et 120 comprimés pelliculés

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

COMPOSITION

L-Cystine500,0 mg
Chlorhydrate
de pyridoxine50,0 mg
Excipients : Les autres composants sont :
Carboxyméthylcellulose sodique, talc, cellulose
microcristalline (Avicel PH 102[®]), stéarate de
magnésium, sepfilm LP 010[®], sepisperse AP
3083 jaune[®], cire de carnauba.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

AUTRES PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES
VITAMINES, AUTRES ASSOCIATIONS

(D. Dermatologie)
(S. Ophtalmologie)

DANS QUELS CAS UTILISER CYSTINE B6 BAILLEUL, comprimé pelliculé?

Ce médicament est préconisé en cas de
cheveux ou d'ongles fragiles et dans le
traitement d'appoint des troubles de la
cicatrisation de la cornée.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CYSTINE B6 BAILLEUL, comprimé pelliculé?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE
dans les cas suivants :
- Cystinurie
- Association à la lévodopa (voir rubrique
interactions médicamenteuses et autres
interactions).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS
ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT
SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU
A VOTRE PHARMACIEN.

Inhibition de l'activité de la Lévodopa
lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la
dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence
d'inhibiteur de la dopadécarboxylase. Afin
d'éviter d'éventuelles interactions entre
plusieurs médicaments, il faut signaler
systématiquement tout autre traitement en
cours à votre médecin ou à votre pharmacien.



BAILLEUL • BIORGA

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CYSTINE B6 BAILLEUL, comprimé pelliculé ?**POSOLOGIE**

4 comprimés par jour en 2 prises à prendre au cours des repas.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DELIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Avaler les comprimés avec un grand verre d'eau.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS

CYSTINE B6 BAILLEUL, comprimé pelliculé DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

2 prises à prendre au cours des repas.

EFFETS NON SOUHAITES**ET GENANTS**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNELEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRESENTATIONS

3400931669883:

Boîte de 20 comprimés pelliculés.

3400936952218:

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

3400938018936 :

Boîte de 120 comprimés pelliculés.

TITULAIRE/EXPLOITANT

Laboratoires BAILLEUL-BIORGA

8, rue Laugier

75017 PARIS

FABRICANT

LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN

20 rue Louis Charles Vernin

77190 Dammarie Les Lys

Ou :


Laboratoires OPODEX

34-46, avenue du Vieux-Chemin-de-St-Denis,

92391 VILLENEUVE-LA-GARENNE

DATE DE REVISION DE LA NOTICE :

13 Février 2008.



AC 53/10/09