LGM03V
95726859

Fluodontyl®

1350 mg
PÂTE DENTIFRICE

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute,
demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Composition qualitative et quantitative

- FLUORURE DE SODIUM 3,000 g (1350 mg de fluor actif pour 100 g = 13500 ppm)
- Excipients : laurylsulfate de sodium, hexamétaphosphate de sodium, phosphate disodique, silice hydratée, carraghénate de sodium, sorbitol à 70%, saccharine sodique, huile essentielle de menthe poivrée Italo-Mitcham, lévomenthol, huile essentielle de badiane de Chine, huile essentielle de cannelle de Ceylan, eugénol, dioxyde de titane, parahydroxybenzoate de méthyle, eau purifiée q.s.p. 100 g.
- 100 g de pâte dentifrice contient 1,350 g de fluor.
- Pâte dentifrice en tube : 6 ml et 75 ml.

Classe pharmaco-thérapeutique

MEDICAMENTS PROPHYLACTIQUES ANTICARIES.

Nom et adresse de l'exploitant

Exploitant :
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS - 163, Quai Aulagnier
92665 Asnières sur Seine Cedex - FRANCE / N° Indigo 0820 20 52 16
Fabricant :
Sanofi Winthrop Industrie
196, rue du Maréchal Juin - 45200 Amilly (F)

Attention !

Prévention de la carie dentaire,
en particulier chez les patients à risque de polycaries quelle qu'en soit l'étiologie.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

En cas d'allergie à l'un des constituants

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- L'utilisation locale de dentifrices fluorés ou de bains de bouche fluorés est parfaitement compatible avec la prise de fluor par voie générale ; elle renforce la protection de la dent contre la carie.
- Cependant, la multiplication des sources potentielles de fluor peut être à l'origine d'une fluorose. Afin d'éviter les cumuls, il est indispensable d'établir un bilan personnalisé des apports (eaux de distribution et minérales, sel fluoré, médicaments sous forme de comprimés, de gouttes, de gommes à mâcher ou de dentifrices fluorés) avant toute prescription fluorée.

LGM03V

• Dans les calculs globaux de l'apport recommandé en ion fluor (0,05 mg de fluor/kg/j tous apports fluorés confondus et sans dépasser 1 mg/j), il faut tenir compte des doses possibles d'ingestion de dentifrice (60 à 30% entre 3 et 7 ans), qui vont varier selon l'âge et la concentration de la pâte utilisée.

• Les enfants de moins de 6 ans doivent utiliser des dentifrices dont la teneur en fluor est inférieure ou égale à 500 ppm de fluor (50 mg/100 g). La quantité à utiliser doit être de la grosseur d'un pois et les enfants doivent bien recracher le dentifrice.

A partir de 6 ans, les enfants peuvent utiliser des dentifrices dosés de 1000 à 1500 ppm (100 à 150 mg/100 g). Vérifier le taux de fluor sur l'étiquetage des dentifrices.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Pour une bonne santé bucco-dentaire, il est nécessaire que vous consultiez régulièrement un chirurgien-dentiste.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218).

Comment utiliser ce médicament

POSOLOGIE

Réservé à l'adulte.

Procéder quotidiennement à un brossage soigneux,
- 3 fois par jour, après chaque repas,
- dans le sens vertical de la gencive à l'extrémité de la dent.

Un brossage soigneux dure environ 3 minutes.

Se conformer à l'avis de votre médecin ou de votre chirurgien-dentiste.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie locale. Ne pas avaler.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Se conformer à l'avis de votre médecin ou de votre chirurgien-dentiste.

DURÉE DU TRAITEMENT

Se conformer à l'avis de votre médecin ou de votre chirurgien-dentiste.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Consulter immédiatement votre médecin.

Effets non souhaités et gênants

• En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle, risque d'eczéma et exceptionnellement, réactions allergiques avec urticaire et gêne respiratoire.

• *Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.*

Conservation

• NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Date de révision de la notice : Avril 2002.