

• FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable, ampoule de 2 ml, boîte de 30.

• CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

OLIGOTHÉRAPIE (V : divers).

• DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours de manifestations psychiques ou psychosomatiques mineures de l'enfant de plus de six ans et de l'adulte (troubles légers du sommeil, irritabilité).

• ATTENTION !

a) DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT.

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPÉCIALES. Certains troubles du caractère ou du comportement nécessitent des posologies importantes de lithium. Le lithium sous forme d'oligo-élément n'a pas de place dans le traitement de ces troubles. Chez l'enfant, un trouble du comportement ou un trouble du sommeil nécessite une consultation auprès de votre médecin.

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI. « GRANIONS® DE LITHIUM 1 mg/2 ml, solution buvable en ampoule » ne doit généralement pas être utilisé : au cours de la grossesse (cf. Rubrique Grossesse et allaitement). EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS. AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT. Grossesse : L'utilisation de ce médicament est déconseillée sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse. Si vous

découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état. D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

Allaitement : L'utilisation de ce médicament est à éviter au cours de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

• COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

a) POSOLOGIE.

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE SIX ANS. 1 à 2 ampoules par jour.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION.

Voie orale. Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau, de préférence le matin à jeun ou à distance des repas.

• EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

Ce médicament peut entraîner chez certaines personnes des effets plus ou moins gênants. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• CONSERVATION

- NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

- Un léger dépôt dans la solution n'est pas abnormal. Il est dû à la nature colloïdale de la solution. Dans ce cas, agiter l'ampoule avant utilisation.

• DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : 29 avril 2007.

Titulaire/Exploitant/Fabricant : Laboratoire des GRANIONS® • Le Mercator - 7,rue de l'Industrie Z.I. de Fontvieille - 98000 Monaco

Tél. 00 377 92 05 76 20 www.granions.com