

Sédorrhoïde®

CRISE HÉMORROÏDAIRE

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION : SÉDORRHOÏDE CRISE HÉMORROÏDAIRE, crème rectale.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Bromure de dodéclonium	0,40 g
Esculoside sesquihydraté	0,46 g
Enoxolone	0,93 g
Benzocaïne	2,00 g

Excipients :

Emulgade F (contient de l'alcool cétostéarylique), octyldodécanol (Eutanol G), eau purifiée ... pour 100 g de crème.

FORME PHARMACEUTIQUE : Crème rectale. Tube de 30 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

TOPIQUE EN PROCTOLOGIE (C. Système cardiovasculaire).

TITULAIRE / EXPLOITANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex

FABRICANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
2, rue de la Saussaie - 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament est un anti-inflammatoire et anesthésique local.

Ce médicament est préconisé dans certaines pathologies anales s'accompagnant de douleurs et/ou de démangeaisons et en particulier dans la crise hémorroïdaire.

! ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie connue à la benzocaïne (anesthésique).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Le traitement doit être de courte durée. Si la douleur ne cède pas rapidement, consultez sans tarder votre médecin. Ce médicament contient de l'alcool cétostéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

SPORTIFS : Ce médicament contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS : Alcool cétostéarylique

→ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :

POSOLOGIE : 2 ou 3 applications par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie rectale.

→ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS. SIGNALEZ À VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

→ CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

→ DATE DE REVISION DE LA NOTICE : juillet 2006.

8021710/07



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex