

Acthéane®

COMPRIMÉ

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.*
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 1 mois, consultez un médecin.*
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.*

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **ACTHÉANE, comprimé** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **ACTHÉANE, comprimé** ?
- 3- Comment utiliser **ACTHÉANE, comprimé** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **ACTHÉANE, comprimé** ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE ACTHÉANE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ACTHÉANE, comprimé est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les bouffées de chaleur et les troubles fonctionnels de la ménopause.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ACTHÉANE, comprimé ?

Si votre médecin vous a informée d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec ACTHÉANE, comprimé :

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patientes présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patientes présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse et allaitement

ACTHÉANE, comprimé est indiqué chez les femmes ménopausées. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de ACTHÉANE, comprimé

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

3- COMMENT UTILISER ACTHÉANE, comprimé ?

Posologie : 2 comprimés matin et soir, à sucer lentement à distance des repas.

Mode d'administration : Voie sublinguale.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Durée du traitement : La durée du traitement ne doit pas dépasser 1 mois. Au-delà, consulter un médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **ACTHÉANE, comprimé** est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5- COMMENT CONSERVER ACTHÉANE, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser **ACTHÉANE, comprimé** après la date de péremption mentionnée sur la boîte. Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient **ACTHÉANE, comprimé** ?

Les substances actives sont :

Actaea racemosa 4 CH	0,5 mg	Lachesis mutus 5 CH	0,5 mg
Arnica montana 4 CH	0,5 mg	Sanguinaria canadensis 4 CH	0,5 mg
Glonoinum 4 CH	0,5 mg		

Les autres composants sont : Saccharose, Lactose et Stéarate de magnésium.

Qu'est ce que ACTHÉANE, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Il est conditionné dans une boîte contenant 60 comprimés.

Titulaire et exploitant :

BOIRON - 20, rue de la Libération - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - France

Fabricant :

BOIRON - 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est février 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Affsaps (France).



Les laboratoires Boiron cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Boiron participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Boiron vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.