

Tanganil 500 mg

Acétyl-leucine

comprimés

COMPOSITION UNITAIRE

Acétyl-dl-leucine.....500 mg

Excipients : amidon de blé, amidon de maïs pré-gélatinisé, carbonate de calcium, stéarate de magnésium q.s.p. 1 comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIVERTIGINEUX

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT

PIERRE FABRE MÉDICAMENT

45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans le traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie connue à l'acétylleucine ou à l'un des autres composants de ce médicament.

- allergie ou intolérance au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre. D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Amidon de blé (gluten).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Chez l'adulte :

En moyenne 3 à 4 comprimés en 2 prises matin et soir.

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique ; au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Des réaction cutanées (éruption, rougeurs, urticaire et démangeaisons) ont été très rarement observées.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Date de révision de cette notice : février 2007.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.



Pierre Fabre