

CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI

Comprimé à sucer

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CALCIPRAT VITAMINE D3 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIPRAT VITAMINE D3 ?
3. COMMENT PRENDRE CALCIPRAT VITAMINE D3 ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CALCIPRAT VITAMINE D3 ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CALCIPRAT VITAMINE D3 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE

(A: Appareil digestif et Métabolisme - Médicament actif sur le bilan du calcium).

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carence en calcium et en vitamine D,
- en association aux traitements de l'ostéoporose lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIPRAT ?

Ne prenez jamais CALCIPRAT VITAMINE D3 en cas de :

- hypersensibilité à la vitamine D ou à l'un des constituants,
- quantité de calcium dans le sang anormalement élevée (hypercalcémie),
- élimination exagérée de calcium par l'urine (hypercalciurie),
- calculs rénaux (lithiase calcique),
- phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

Faites attention avec CALCIPRAT VITAMINE D3 en cas de :

- de traitement prolongé, il est nécessaire de faire

contrôler régulièrement la quantité de calcium éliminée dans les urines (calciurie). En fonction du résultat, votre médecin pourra être amené à réduire, voire à interrompre votre traitement,

- d'administration supplémentaire de calcium et de vitamine D à fortes doses qui doit se faire sous stricte surveillance médicale.

- en cas de traitement associé à base de fluorure de sodium ou de biphosphonate, il est conseillé d'attendre deux heures entre les prises de ces médicaments et de CALCIPRAT VITAMINE D3 et en cas de traitement avec un antibiotique de la famille des tétracyclines, il est conseillé d'attendre trois heures.

- en cas de sarcoïdose ou d'insuffisance rénale.
- en cas de galactosémie, de syndrome de mal-absorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares), en raison de la présence de lactose.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment digitaliques, tétracyclines, vitamine D, fluorure de sodium, biphosphonates, diurétiques, antiépileptiques, corticoïdes même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance

Grossesse et allaitement

- CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer
En cas de grossesse, ne pas dépasser 1500 mg de calcium et 600 UI de vitamine D3 par jour : soit un comprimé par jour.

- CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI, comprimé à sucer

Du fait de la quantité de vitamine D, ce produit n'est pas indiqué pendant la grossesse et l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : aspartam, lactose.

3. COMMENT PRENDRE CALCIPRAT VITAMINE D3?

Posologie

- CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI
Deux comprimés par jour.
- CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI
Un comprimé par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de CALCIPRAT 1000 VITAMINE D3 1000 mg 800 / UI, comprimé à sucer est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.
Comprimé à sucer puis prendre un verre d'eau.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez pris plus de CALCIPRAT VITAMINE D3 que vous n'auriez dû :

Lors de la prise d'une dose excessive de ce traitement, les symptômes suivants peuvent apparaître : nausées, vomissements, soif intense, constipation.
Si de tels effets se manifestent, prévenez immédiatement votre médecin qui prendra les mesures nécessaires.
En cas de surdosage prolongé, des calcifications peuvent apparaître dans les vaisseaux ou les tissus.

Si vous oubliez de prendre CALCIPRAT VITAMINE D3 :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CALCIPRAT VITAMINE D3 est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Constipation, diarrhées
- Douleurs épigastriques, ballonnements,
- Nausées.
- Augmentation de la quantité de calcium dans le sang ou les urines dans certains cas.
- Réactions cutanées allergiques du type démangeaison, éruption cutanée étendue, urticaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CALCIPRAT VITAMINE D3?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CALCIPRAT VITAMINE D3, comprimé à sucer après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Il n'y a pas de précautions particulières de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI ?

Les substances actives sont :

Calcium élément500 mg
Sous forme de Carbonate de calcium 1250 mg
Cholécalciférol (Vitamine D3)..... 400 U.I
Pour un comprimé à sucer.

Les autres composants D3 sont :

Xylitol, povidone K30, aspartam, lévomenthol, arôme menthe*, talc, stéarate de magnésium, lactose monohydraté.

*Composition de l'arôme menthe : huile essentielle de menthe poivrée, gomme arabique, maltodextrine, sorbitol.

Que contient CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI, comprimé à sucer ?

Les substances actives sont :

Calcium élément1000 mg
Sous forme de Carbonate de calcium 2500 mg
Cholécalciférol (Vitamine D3)..... 800 U.I

Les autres composants D3 sont :

Xylitol, povidone K30, aspartam, lévomenthol, arôme menthe*, talc, stéarate de magnésium, lactose monohydraté.

*Composition de l'arôme menthe : huile essentielle de menthe poivrée, gomme arabique, maltodextrine, sorbitol.

Forme pharmaceutique et contenu

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à sucer.

CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI : boîte de 60.

CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI : boîte de 30 ou 90.

Titulaire de l'AMM et Exploitant

ALFA WASSERMANN PHARMA
67, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET

Fabricant

LABORATOIRES MACORS - ZI Plaines des Isles
89000 AUXERRE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21/03/2012.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).