


FIXICAL® 500 mg

CALCIUM



COMPRIMÉ À CROQUER OU À SUCER

COMPOSITION

Carbonate de calcium, correspondant à calcium élément500,00 mg
Excipients : sorbitol, aspartam, arôme orange (alpha pinène, myrcène, limonène, octanal, décanol, linalol, citral, gomme arabique), stéarate de magnésium pour un comprimé

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

CALCIUM / ELEMENT MINERAL (A: appareil digestif et métabolisme)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament contient du calcium.

Il est indiqué :

- en cas de carences en calcium suite à une augmentation des besoins (croissance, grossesse, allaitement)
- en traitement d'appoint des décalcifications osseuses chez le sujet âgé, ou après la ménopause, une corticothérapie, une immobilisation prolongée après reprise de la mobilité.

TITULAIRE / EXPLOITANT

Laboratoires EXPANSCIENCE,
10 avenue de l'Arche, 92400 COURBEVOIE
Tel. : 01 43 34 60 00

FABRICANT

Laboratoires EXPANSCIENCE,
Rue des Quatre Filles, 28230 EPERNON

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à l'un des constituants,
- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),
- hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans les urines),
- lithiase calcique (calcul rénal), calcifications tissulaires,
- immobilisation prolongée s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie : le calcium ne doit être administré qu'à la reprise de la mobilité,
- en raison de la présence d'aspartam, ce médicament est contre-indiqué en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire due à un déficit enzymatique).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISE EN GARDE SPECIALES

Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux. NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL.

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire).

EXPANSCIENCE®

LABORATOIRES

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de traitement prolongé ou d'insuffisance rénale : il est nécessaire de faire contrôler le taux de calcium dans les urines et dans le sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de carence, votre médecin peut vous prescrire ce médicament au cours de la grossesse ou de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Aspartam, sorbitol

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

Adulte : 2 à 3 comprimés à croquer ou à sucer par jour.

Enfant de 6 à 10 ans : 1 comprimé à croquer ou à sucer par jour.

Enfant de plus de 10 ans : 2 comprimés à croquer ou à sucer par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- . IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- . NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Les comprimés sont à croquer, puis à avaler avec un grand verre d'eau, ou à sucer.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS

GENANTS :

- Troubles digestifs de type constipation, flatulence, nausées,
- En cas de traitement prolongé à fortes doses : risque de modification du taux de calcium dans sang ou les urines.
- Eruption cutanée étendue, urticaire et démangeaisons

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Janvier 2005

8302320



Les Laboratoires Expanscience participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

Laboratoires Expanscience
10, avenue de l'Arche, 92419 Courbevoie Cedex
Tél. : +33 (0)1 43 34 60 00 - Fax : +33 (0)1 43 34 61 00