

# Fumafer<sup>®</sup> 66 mg

fer

comprimé pelliculé

SANOFI 

## **Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.**

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

## **IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT**

### **Composition**

Fumarate ferreux ..... 200 mg  
(quantité correspondante en fer 66 mg)  
pour un comprimé pelliculé.

### **Excipients :**

Carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, povidone K 90, docusate sodique, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 6000.

### **Forme pharmaceutique et présentations**

Comprimé pelliculé (Boîte de 100).

Comprimé pelliculé (Boîte de 50, modèle hôpital).

### **Classe pharmaco-thérapeutique**

ANTIANÉMIQUE

FUMARATE DE FER PAR VOIE ORALE

(B : sang et organes hématopoïétiques)

### **Titulaire et exploitant**

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland – 75014 Paris – France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

### **Fabricant**

SANOFI-AVENTIS, SA – Riells i Viabrea – Espagne

## **DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

Ce médicament contient du fer.

Il est préconisé dans le traitement des anémies dues à un manque de fer chez l'adulte et l'enfant à partir de 10 ans et en traitement préventif de la carence en fer chez la femme enceinte.

## **ATTENTION !**

### **Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants : surcharge en fer, en particulier dans certaines formes d'anémies (thalassémie, anémies réfractaires, anémie par insuffisance médullaire).

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Mises en garde spéciales**

– Ce médicament n'est pas préconisé dans le traitement des anémies liées aux maladies inflammatoires.

– Une consultation médicale est nécessaire avant la mise en route de ce traitement, afin de rechercher la cause de l'anémie.

### **Précautions d'emploi**

– La prévention de la carence en fer chez le nourrisson repose sur la mise en route précoce d'une alimentation diversifiée.

– La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer.

– Un contrôle de l'efficacité est utile après 3 mois de traitement, consultez votre médecin.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Interactions médicamenteuses et autres interactions**

*AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN, notamment des médicaments injectables contenant du fer.*

### **Grossesse – Allaitement**

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT À PARTIR DE 10 ANS.

#### • Traitement curatif :

- Chez l'adulte et l'enfant à partir de 30 kg (environ 10 ans) : en moyenne, 2 à 3 comprimés par jour.

#### • Traitement préventif :

- Chez la femme enceinte : 1 comprimé par jour, pendant les deux derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4ème mois).

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS.

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

### Mode et voie d'administration

Voie orale.

### Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

L'horaire de la prise et la répartition est à adapter en fonction de la tolérance digestive.

Afin de limiter les effets indésirables, il est conseillé de fractionner la dose en plusieurs prises quotidiennes.

### Durée du traitement

Elle doit être suffisante pour corriger l'anémie et restaurer les réserves en fer (de l'ordre de 3 à 6 mois).

### Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas d'ingestion massive, consultez immédiatement un médecin.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :*

- Possibilité de troubles digestifs à type de nausées, constipation ou diarrhées,
- Coloration habituelle des selles en noir ou gris noir,
- Réactions allergiques possibles.

*NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.*

## CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

## DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Mai 2008.