

Moxydar®

comprimé pour suspension buvable

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MOXYDAR et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOXYDAR ?
3. Comment prendre MOXYDAR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOXYDAR ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MOXYDAR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Anti-acide (A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans les douleurs, brûlures ou aigreurs d'estomac ou de l'œsophage et le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MOXYDAR ?

Ne prenez jamais MOXYDAR

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'une des substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (la liste des composants est détaillée à la rubrique 6),
- si vous souffrez d'une maladie rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

Faites attention avec MOXYDAR

Mises en gardes spéciales

- Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin,
- Si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter immédiatement votre médecin.

Précautions d'emploi

NE PRENEZ PAS CE MÉDICAMENT SANS AVIS MÉDICAL en cas de dialyse chronique.

Les anti-acides peuvent diminuer l'effet de nombreux médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Par précaution, il convient de prendre ce médicament à distance d'autres médicaments (à 2 heures d'intervalle si possible).

Parallèlement à l'emploi de ce médicament, il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno-diététiques :

- éviter de se coucher immédiatement après les repas,
- ne pas dormir à plat (surélever la tête du lit pour diminuer la fréquence du reflux nocturne),
- éviter les travaux prolongés, buste penché en avant (ménage, jardinage ...),
- éviter les repas trop abondants.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Ce médicament peut être prescrit pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE MOXYDAR ?

Dosage

Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est :

Traitement symptomatique des douleurs liées aux affections œso-gastro-duodénales

Un comprimé au moment des crises douloureuses sans dépasser 4 prises par jour.

Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien

• En période d'attaque: 1 comprimé après chacun des 3 repas et un supplémentaire en cas de douleur pendant 4 à 6 semaines.

• En traitement d'entretien: 1 comprimé au moment des douleurs.

Mode d'administration

Voie orale. Dissoudre le comprimé dans un demi verre d'eau.

Durée du traitement

La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

Si vous avez pris plus de MOXYDAR que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre MOXYDAR

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MOXYDAR peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets suivants ont été rapportés :

- constipation/diarrhée,
 - diminution du taux de phosphore dans le sang, en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses.
- Si vous ressentez l'effet mentionné comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MOXYDAR ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MOXYDAR après la date d'expiration mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient MOXYDAR ?

Les substances actives sont :

Oxyde d'aluminium hydraté.....	500,0 mg
Phosphate d'aluminium.....	300,0 mg
Hydroxyde de magnésium.....	500,0 mg
Gomme guar enrobée.....	200,0 mg

Les autres composants sont :

siméticone, oléate de sorbitan, polysorbate 80, cyclamate de sodium, saccharine sodique, stéarate de magnésium, arôme menthe.

Qu'est-ce que MOXYDAR et contenu de son emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'un comprimé pour suspension buvable. Boîte de 30.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché et Exploitant

Laboratoires GRIMBERG

19 rue Poliveau

75005 PARIS - FRANCE

TEL : (+33) 1 55 43 34 00

Fabricant

Laboratoires GRIMBERG

ZA des Boutries - 5 rue Vermont

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 02/2000.