

# **OPTICRON**

## **2 POUR CENT, collyre**

Cromogliciate de sodium

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

---

1. **Qu'est-ce que Opticron 2 pour cent, collyre et dans quels cas est-il utilisé ?**
2. **Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Opticron 2 pour cent, collyre ?**
3. **Comment utiliser Opticron 2 pour cent, collyre ?**
4. **Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
5. **Comment conserver Opticron 2 pour cent, collyre ?**
6. **Informations supplémentaires.**

### **1. Qu'est-ce que Opticron 2 pour cent, collyre et dans quels cas est-il utilisé ?**

---

La classe pharmacothérapeutique de ce médicament est : anti-allergique local.

Ce collyre est indiqué en cas de maladie de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique).

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Opticron 2 pour cent, collyre ?**

---

### **N'UTILISEZ JAMAIS Opticron 2 pour cent, collyre :**

- en cas d'allergie connue à l'un des composants du collyre.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## **FAITES ATTENTION AVEC Opticron 2 pour cent, collyre :**

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.

- Ne pas dépasser la posologie recommandée.
- En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.
- Refermer soigneusement le flacon après utilisation.
- En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.
- Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.
- Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## **Utilisation ou prise d'autres médicaments**

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre.

Dans ce cas, attendre la fin des symptômes pour conduire ou utiliser une machine.

## **Informations importantes concernant certains composants de Opticron 2 pour cent, collyre.**

Les excipients suivants sont des composants dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients : Chlorure de benzalkonium.

### 3. Comment utiliser Opticron 2 pour cent, collyre ?

---

#### Posologie

Adulte et enfant : selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers.

Chez l'enfant un avis médical est nécessaire.

Ne dépassez pas la posologie recommandée.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

#### Mode et voie d'administration

Voie locale.

##### EN INSTILLATION OCULAIRE

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
- Évitez le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières.
- Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Après utilisation, refermez soigneusement le flacon.

#### Fréquence d'administration

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

#### Durée du traitement

Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

#### Instructions en cas de surdosage

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

---

Comme tous les médicaments, Opticron 2 pour cent, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de survenue de réaction allergique aux composants du produit.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. Comment conserver Opticron 2 pour cent, collyre ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser Opticron 2 pour cent, collyre après la date de péremption mentionnée sur le flacon ou la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

### Conditions de conservation

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Le flacon ouvert se conserve 15 jours.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. Informations supplémentaires

### Que contient Opticron 2 pour cent, collyre ?

La substance active est :

Cromoglicate de sodium ..... 2,00 g  
Pour 100 ml de solution

Les autres composants sont : Eau pour préparations injectables, chlorure de benzalkonium, édétate de sodium.

### Forme pharmaceutique et contenu

Ce médicament se présente sous forme de collyre.

Flacon de 5 ml.

### Titulaire et Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE  
PLACE LUCIEN-AUVERT - 77020 MELUN CEDEX



### Fabricant

EXCELVISION - RUE DE LA LOMBARDIERE - 07100 ANNONAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 15 juillet 2010. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).