

**sulfarlem S 25<sup>®</sup> mg**  
**comprimé enrobé**  
**anétholtrithione**

**Composition :**

Pour un comprimé enrobé :

Anétholtrithione ..... 25,00 mg  
Excipients : lactose, gomme arabique, amidon de blé, saccharose, gomme guar, silice colloïdale hydratée, stéarate de magnésium, gélatine, talc, dioxyde de titane (E 171), jaune orangé S (E 110), rouge de cochenille A (E 124), cire de carnauba.

**Présentation :** Boîte de 60 comprimés.

**Classe pharmaco-thérapeutique :**

Substitut salivaire et lacrymal.

(A : appareil digestif et métabolisme/stomatologie),

(S : organes des sens/ophtalmologie).

**Titulaire-Exploitant :** EG LABO - Laboratoires EuroGenerics - "Le Quintet" - Bâtiment A - 12 rue Danjou  
92517 BOULOGNE-BILLAN COURT Cedex

**Fabricant :** ROTTENDORF PHARMA - Zone industrielle n°2 - Batterie 1000 - 59309 VALENCIENNES Cedex

**Indications thérapeutiques :**

Ce médicament est préconisé en cas de sécheresse de la bouche et des yeux.

**Contre-indications :**

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- enfant de moins de 6 ans,

- obstruction des voies biliaires (notamment calculs biliaires).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Mises en garde spéciales :**

La coloration plus foncée des urines est un phénomène normal au cours du traitement.

**Précautions d'emploi :**

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Interactions médicamenteuses et autres interactions :**

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

**Grossesse-allaitement :**

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

**Excipients à effet notoire :** lactose, amidon de blé, saccharose, jaune orangé S (E 110), rouge de cochenille A (E 124).

**Posologie et mode d'administration :**

Voie orale. 1 comprimé 3 fois par jour au moment des repas.

**Effets indésirables :**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : légers troubles digestifs (diarrhée, flatulence, météorisme), régressant en réduisant les doses.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

**Conservation :**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

**Précautions particulières de conservation :**

A conserver à une température inférieure à 25°C.

**Date de révision :** Juin 2005.

**Ceci est un médicament.**  
**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.**