

Revitalose

VITAMINE C 1000 MG

SANS SUCRE

5 ACIDES AMINÉS

SOLUTION BUVABLE
ÉDULCORÉE AU SORBITOL

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?
3. COMMENT PRENDRE REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TONIQUE

Ce médicament est un antiasthénique. Il est indiqué dans les états de fatigue passagers qui accompagnent les efforts physiques intenses, les états de surmenage et de convalescence.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais REVITALOSE SANS SUCRE, solution

buvable édulcorée au sorbitol dans les cas suivants :

- En cas d'allergie à l'un des constituants.
- En présence de calculs rénaux lorsque la dose de vitamine C est supérieure à 1 g/jour.

- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence de phénylalanine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Faites attention avec REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par ampoule buvable.

En raison de l'effet légèrement stimulant de la vitamine C, il est préférable de ne pas prendre ce produit en fin de journée.

Chez les diabétiques, la vitamine C peut modifier la réponse des réactifs sanguins et urinaires.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

L'allaitement est possible en cas de traitement par REVITALOSE. Par ailleurs, un régime alimentaire équilibré permet de couvrir les besoins de notre organisme en vitamine C.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :

sorbitol, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), éthanol.

3. COMMENT PRENDRE REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est 1 dose par jour, à dissoudre dans un verre d'eau, de préférence le matin.

Une dose est composée d'une ampoule A et B.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Durée du traitement

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

Si vous avez pris plus de REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage, les fortes doses de vitamine risquent de provoquer :

- douleurs d'estomac,
- diarrhée,
- gêne à l'émission des urines,
- une coloration rouge des urines est liée à une destruction des globules rouges chez les patients ayant un déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges due à l'absence d'une enzyme).

Si vous avez pris plus de REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol qu'il ne fallait, consultez un médecin.

Si vous oubliez de prendre REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

A fortes doses de vitamine C (supérieure à 1 g/jour), il est possible que surviennent :

- douleurs d'estomac,
- diarrhée,
- gêne à l'émission des urines,
- une coloration rouge des urines est liée à une destruction des globules rouges chez les patients ayant un déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges due à l'absence d'une enzyme).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol après la date de péremption mentionnée sur la boîte et les ampoules buvables. La date d'expiration fait

référence au dernier jour du mois.

Pas de précaution particulière de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol ?

Les substances actives sont :

AMPOULE A :

Aspartate de magnésium dihydraté	0,200 g
L-Leucine	0,025 g
Monochlorhydrate de L-Lysine	0,200 g
L-Phénylalanine	0,010 g
L-Valine	0,010 g
Pour une ampoule de 5 ml	

AMPOULE B :

Ascorbate de sodium.....	1,125 g
Quantité correspondant en Acide ascorbique à	1,000 g
Pour une ampoule de 5 ml	

Les autres composants sont :

AMPOULE A :

Sorbitol, arôme orange soluble*, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé, acétate de sodium, acide acétique glacial, eau purifiée.

*Composition de l'arôme orange soluble : huiles essentielles d'orange et de mandarine, butyrate d'éthyle, acétaldéhyde, acétate d'éthyle, hexanol, dodécanol, acétate de linalyle, éthanol.

AMPOULE B :

Parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, gallate de propyle, alcool à 96 % v/v, glycérol, eau purifiée.

Qu'est-ce que REVITALOSE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution buvable, ampoule de 5 ml, boîte de 14 ampoules jumelées.

Titulaire/Exploitant

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel-Gance
92100 Boulogne

Fabricant

NEXTPHARMA S.A.S

17, route de Meulan
78520 Limay

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Février 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Information médicale tél. : 0800 95 05 64



Pierre Fabre



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament collaborent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.