

Spasfon-Lyoc[®] 160mg lyophilisat oral

— Phloroglucinol

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral ?
3. Comment prendre SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

SPASFON-LYOC[®] 160 mg appartient à une classe

de médicaments appelés antispasmodiques. Il agit contre les spasmes (contractions).

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral ?

Ne prenez jamais SPASFON-LYOC[®] 160 mg, lyophilisat oral dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au phloroglucinol ou à l'un des autres composants contenus dans SPASFON-LYOC[®] 160 mg.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER

L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral :

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

Si vous êtes une femme enceinte, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce médicament. L'utilisation de SPASFON-LYOC® 160 mg ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'utilisation de SPASFON-LYOC® 160 mg est déconseillée chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

Prenez 1 lyophilisat oral, au moment de la crise. Renouveler en cas de spasmes importants en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 lyophilisats oraux par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Les lyophilisats oraux se dissolvent facilement dans l'eau ou la salive.

Vous pouvez :

- soit dissoudre le lyophilisat oral dans un verre d'eau,
- soit le laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Si vous avez pris plus de SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral :

Ne prenez pas double dose pour compenser celle que vous auriez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral est susceptible

d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Dans certains cas une allergie peut survenir.

Vous reconnaitrez les signes d'une allergie :

- par des boutons et/ou des rougeurs sur la peau, prurit,
- par un brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke),
- ou par un malaise brutal dû à une chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser SPASFON-LYOC® 160 mg après la date de péremption mentionnée sur la boîte et la plaquette après « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précaution particulière de conservation.

Ne pas utiliser, si vous remarquez des signes visibles de dégradation du produit.

La surface des lyophilisats peut ne pas être lisse, mais parfois bosselée. Cet aspect irrégulier

n'affecte pas la qualité et l'efficacité du produit.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral ?

La substance active est :

La substance active est le phloroglucinol (160 mg par lyophilisat).

Les autres composants sont :

Mannitol, dextran 70, sucralose, hydroxystéarate de macrogol 15.

Qu'est ce que SPASFON-LYOC® 160 mg, lyophilisat oral et contenu de l'emballage extérieur ?

SPASFON-LYOC® 160 mg se présente sous forme de lyophilisats oraux blancs à blanc crème et ronds. Les lyophilisats oraux sont des comprimés qui se dissolvent facilement dans l'eau ou la salive.

Les lyophilisats oraux sont présentés sous plaquettes thermoformées. Dans certains pays, ces plaquettes peuvent être suremballées dans un sachet.

SPASFON-LYOC® 160 mg est
présenté en boîte de 5 lyophilisats
oraux.

Titulaire

CEPHALON FRANCE

20, rue Charles Martigny
94700 Maisons-Alfort
France

Exploitant

CEPHALON FRANCE

20, rue Charles Martigny
94700 Maisons-Alfort
France

Fabricant

CEPHALON FRANCE

20, rue Charles Martigny
94700 Maisons-Alfort
France

**La dernière date à laquelle
cette notice a été approuvée
est avril 2011.**

Des informations détaillées sur
ce médicament sont disponibles
sur le site internet de l'Afssaps
(France).



Cephalon cotise à Adelphi, pour les emballages
de médicaments vendus en officine. Cephalon
participe de plus à CYCLAMED, association
chargée de la collecte et de l'élimination respec-
tueuse de l'environnement des médicaments non
utilisés, périmés ou non. Cephalon vous demande
donc de rapporter vos médicaments non utilisés à
votre pharmacie.