

# XOLAAM

Hydroxydes d'aluminium et de magnésium

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT. ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS

IMPORTANTES POUR VOTRE TRAITEMENT.

SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS, SI VOUS AVEZ UN DOUTE, DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

**GARDEZ CETTE NOTICE, VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE LA RELIRE.**

**SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE PHARMACIEN.**

**SI LES SYMPTÔMES S'AGGRAVENT OU PERSISTENT, CONSULTEZ UN MÉDECIN.**

**SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDÉSIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, OU SI VOUS RESSENTEZ UN DES EFFETS MENTIONNÉS COMME ÉTANT GRAVE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.**

## Suspension buvable en flacon

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que Xolaam, suspension buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Xolaam, suspension buvable en flacon ?
3. Comment prendre Xolaam, suspension buvable en flacon ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Xolaam, suspension buvable en flacon ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE XOLAAM, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-ACIDE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans les douleurs, brûlures ou aigreurs de l'estomac ou de l'œsophage.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE XOLAAM, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais Xolaam, suspension buvable en flacon :**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec Xolaam, suspension buvable en flacon :**

**Mises en garde :**

Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin.

Si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter immédiatement votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

**Précautions d'emploi :**

En cas de dialyse rénale chronique ou de traitement prolongé, tenir compte de l'apport en aluminium.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

**Grossesse et allaitement :**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notable :** sorbitol.

### 3. COMMENT PRENDRE XOLAAM, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?

#### **Posologie :**

1 cuillère à soupe à prendre au moment des douleurs, chez l'adulte.

#### **Mode d'administration :**

Voie orale.

Bien agiter le flacon avant l'emploi.

#### **Fréquence d'administration :**

Ce médicament doit être pris au moment des douleurs, sans dépasser 6 prises par jour.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Xolaam, suspension buvable en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses, une diminution du taux de phosphore dans le sang peut survenir.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER XOLAAM, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Xolaam, suspension buvable en flacon après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

À conserver à une température supérieure à 4°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### **Que contient Xolaam, suspension buvable en flacon ?**

##### **Les substances actives sont :**

Aluminium (gel d'hydroxyde)

Quantité correspondant à aluminium (hydroxyde) ..... 3,5 g

Magnésium (gel d'hydroxyde)

Quantité correspondant à magnésium (hydroxyde) ..... 4,0 g

Pour 100 ml.

##### **Les autres composants sont :**

Acide chlorhydrique concentré, acide citrique monohydraté, huile essentielle de menthe poivrée, mannitol, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, sorbitol à 70 pour cent, saccharine sodique, eau purifiée.

#### **Qu'est-ce que Xolaam, suspension buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable en flacon.

Flacon de 250 ml.

**Titulaire - Exploitant :** Ranbaxy Pharmacie Génériques - 11-15, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux

**Fabricant :** Pharmatis - 60190 Estrées-Saint-Denis.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l' Afssaps (France) : [www.afssaps.fr](http://www.afssaps.fr).

Avril 2010

## **Xolaam, suspension buvable en flacon**

5210-03-AA



Ranbaxy Pharmacie Génériques cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Ranbaxy Pharmacie Génériques participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Ranbaxy Pharmacie Génériques vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

**Ranbaxy Pharmacie Génériques - 11-15 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux**