

Imodiumliquicaps®

2 mg, capsule molle

Chlorhydrate de loperamide

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut-être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle ?
3. Comment prendre IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-DIARRHEIQUE

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Ce traitement est un complément des mesures diététiques : lire attentivement le chapitre «précautions d'emploi».

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle?

Ne prenez jamais IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle dans les cas suivants :

- Si vous souffrez d'une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite hémorragique (maladie inflammatoire du rectum et parfois du gros intestin se manifestant par des diarrhées avec des glaires et du sang).
- En cas d'allergie à l'un des constituants de la capsule.
- Si vous avez une fièvre importante (au dessus de 38°C) ou en cas de présence de sang dans les selles ou en cas de vomissement.
- Si votre diarrhée survient après avoir pris des antibiotiques.
- Si vous êtes constipé ou en cas de gonflement abdominal.
- Chez l'enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle :

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Vous devez arrêter ce traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants:

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- en cas de constipation ou de distension abdominale,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée.

Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Précautions d'emploi

N'utilisez ce médicament qu'avec précaution: **PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN** en cas de maladie du foie car une surveillance médicale pendant le traitement est nécessaire.

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Il est nécessaire de :

- se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (boire au moins 2 litres),
- s'alimenter le temps de la diarrhée,
- supprimer les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés,
- privilégier les viandes grillées, le riz.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient du LOPERAMIDE. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Attention, ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de certaines machines.

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle?

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.
Commencez par 2 capsules en une seule prise (soit 4 mg de lopéramide).

Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 capsule supplémentaire, mais :

- ne jamais dépasser 6 capsules par jour,
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les capsules à l'aide d'un verre d'eau.

Espacez les prises.

Prenez 1 capsule après chaque selle non moulée mais :

- ne jamais dépasser 6 capsules par jour,
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

Si vous avez pris plus de IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage accidentel, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Les effets indésirables les plus fréquents (plus de 1 patient sur 100) sont les nausées, la constipation et les crampes abdominales.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

- Réactions allergiques pouvant inclure des difficultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement du visage ou des réactions cutanées (rash, urticaire ou démangeaison).
- Vomissement, indigestion, sécheresse buccale, constipation sévère, douleur ou gonflement du ventre, flatulence.
- Eruption cutanée.
- Fatigue.
- Difficulté à uriner.
- Somnolence, vertiges, perte ou diminution de la conscience.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle?

La substance active est :

Chlorhydrate de lopéramide 2 mg

Pour une capsule molle

Les autres composants sont :

Capsule : Monocaprylate de propylène glycol, Propylène glycol, Eau purifiée.

Enveloppe de la capsule : Gélatine, Glycérol 99%, Propylène glycol, Bleu Brillant FCF (E133), Lécithine de soja, Triglycérides à chaîne moyenne.

Qu'est ce que IMODIUMLIQUICAPS® 2 mg, capsule molle et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle. Boîte de 12.

Les capsules sont ovales, bleu clair.

Titulaire / Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Information médicale : 00 800 260 26 000

Fabricant

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA

74 RUE PRINCIPALE

F-67930 BEINHEIM

FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est février 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Conseils / Education sanitaire :

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Ce médicament traite les symptômes des diarrhées aiguës de l'adulte, mais ne dispense pas d'une réhydratation, accompagnée d'une hygiène diététique.

Il est donc nécessaire de boire abondamment des boissons sucrées (jus de fruits) et des bouillons salés pour compenser ces pertes. Evitez lait, légumes verts, crudités, fruits, épices, jusqu'à disparition des diarrhées.

Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages de médicaments vendus en officine.



Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.