

Imodium caps®

Gélule

Lopéramide 2mg

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE IMODIUMCAPS®, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMCAPS®, gélule?
3. COMMENT PRENDRE IMODIUMCAPS®, gélule?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER IMODIUMCAPS®, gélule?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE IMODIUMCAPS®, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIDIARRHÉIQUE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Ce traitement est un complément de mesures diététiques : lire attentivement le chapitre «précaution d'emploi».

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMCAPS®, gélule?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais IMODIUMCAPS®, gélule :

- Si vous souffrez d'une maladie chronique de l'intestin ou du côlon, notamment au cours de poussées aiguës de recto-colite hémorragique.
 - en cas d'allergie à l'un des constituants de la gélule.
- EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec IMODIUMCAPS®, gélule :

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Attention : vous ne devez pas prendre ce médicament :

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- si votre diarrhée survient au cours d'un traitement antibiotique (risque d'atteinte sévère du colon).

De même vous devez arrêter ce traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en cas de fièvre ou de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- en cas de constipation ou de distension abdominale,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

En raison de la présence de lactose ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN en cas de maladie du foie car une surveillance médicale pendant le traitement est nécessaire.

La diarrhée entraîne une perte de liquide et de sels minéraux.

Il est nécessaire de :

- se réhydrater avec des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (boire au moins 2 litres).
- s'alimenter le temps de la diarrhée. Supprimez les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés. Privilégiez les viandes grillées, le riz.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament contient du LOPERAMIDE. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Attention, ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de certaines machines.

Liste des excipients à effet notoire

Lactose

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMCAPS®, gélule?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

Commencez par 2 gélules en une seule prise (soit 4 mg de lopéramide).

Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 gélule supplémentaire, mais :

- ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode et voie d'administration

Voie orale

Avalez les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

Espacez les prises

Prenez 1 gélule après chaque selle non moulée, mais :

- ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

Si vous avez utilisé plus IMODIUMCAPS®, gélule que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre IMODIUMCAPS®, gélule : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, IMODIUMCAPS®, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Constipation et / ou distension du ventre,
- Réactions allergiques (éruption cutanée, urticaire et exceptionnellement choc allergique grave)
- Fatigue, somnolence, vertiges.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMCAPS®, gélule?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser IMODIUMCAPS®, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient IMODIUMCAPS®, gélule ?

La substance active est :

Chlorhydrate de lopéramide 2,00 mg
(Quantité correspondant à lopéramide base : 1,86 mg)

Pour une gélule

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que IMODIUMCAPS®, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 12.

Titulaire / Exploitant : Johnson & Johnson Santé Beauté France

1 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabricant : Laboratoires JANSSEN-CILAG

27100 Val de Reuil - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Janvier 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Assaps (France).



FR - 364822C