

CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil® 500 mg/50mg, comprimé pelliculé



**BIOGARAN
CONSEIL**

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1** Qu'est-ce que CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil® 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2** Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil® 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?
- 3** Comment prendre CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil® 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?
- 4** Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5** Comment conserver CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?
- 6** Informations supplémentaires.

- 1** **QU'EST-CE QUE CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

AUTRES PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES
VITAMINES, AUTRES ASSOCIATIONS

(D. Dermatologie)
(S. Ophtalmologie)

Ce médicament est préconisé dans le traitement d'appoint des troubles de la cicatrisation de la cornée et en cas d'ongles ou de cheveux fragiles.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?



Ne prenez jamais CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Cystinurie.
- Association à la lévodopa (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



Faites attention avec CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé :

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Inhibition de l'activité de la Lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments,

il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.



Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

COMMENT PRENDRE CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil® 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

4 comprimés par jour en 2 prises à prendre au cours des repas.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

VOIE ORALE

Mode et voie d'administration

Avaler les comprimés avec un grand verre d'eau.

Fréquence d'administration

2 prises à prendre au cours des repas.

Si vous oubliez de prendre CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil®, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Si vous remarquez des effets indésirables ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont :

L-cystine	500,0 mg
Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6)	50,0 mg

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, talc, stéarate de magnésium.

Pelliculage : Opadry II Yellow*, macrogol 6000

*Composition de l'Opadry II Yellow : alcool polyvinylique, talc, macrogol 4000, dioxyde de titane (E171), lécithine de soja, laque aluminique de jaune de quinoléine, oxyde de fer jaune (E172).

Qu'est-ce que CYSTINE / VITAMINE B6 Biogaran conseil 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé, boîte de 20, 60 ou 120 comprimés.

Titulaire / Exploitant

Laboratoires BIOGARAN
15 Boulevard Charles de Gaulle
92707 Colombes cedex

Fabricant

Laboratoires BTT
Zl de Krafft
67150 Erstein

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Août 2011. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France) www.afssaps.fr.