

ANGISPRAY est indiqué en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Classe pharmacothérapeutique :

- ANTISEPTIQUE LOCAL - ANESTHESIQUE LOCAL (R : Système respiratoire)

MERCK Médication Familiale - 18C, Bd Winston Churchill 21070 DUON Fabricant : Laboratoires CHEMINEAU - 93 Route de Monnaie - 37210 VOUVRAY

Précautions d'emploi et mises en garde :

- MISES EN GARDE SPECIALES :

ATTENTION !

Ce médicament contient de l'alcool : le titre alcoolique de la solution est de 35,1 % (V-V), soit 0,20 g d'alcool par pulvérisation.

L'anesthésie provoquée par ANGISPRAY au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif de ne pas utiliser ANGISPRAY avant les repas ou avant la prise de boisson.

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ANGISPRAY n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche et de la gorge.

Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ANGISPRAY en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le coeur et sur le système nerveux avec possibilité de convulsions.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

ANGISPRAY ne doit pas être mis en contact avec les yeux, introduit dans le nez ou dans les oreilles.

Mal de gorge : en cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN. Aphtes, petites plaies de la bouche : en cas de lésions étendues, d'extension des lésions, d'apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie ou de grossesse. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

Grossesse et Allaitement :

- D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre pharmacien ou à votre médecin avant de prendre un médicament.

Ce médicament est déconseillé au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Composition :

Excipients à effet notoire : Alcool,

Substances actives :

Héxétidine 0,182 g

Acide propionique..... 0,118 g

ChloroDutanol hémihydrate..... 0,500 g

Excipients : huile essentielle de cannelle de Ceylan, huile essentielle de girofle, huile essentielle de badiane de Chine, huile essentielle de menthe poivrée, alcool éthylique à 95°, glycérol,

eau purifiée q.s.p..... 100 g

Gaz propulseur : azote (pression : 7 à 8 bars).

Titre alcoolique volumique : 35,1% (V-V).

100 ml de solution délivrent 27,7 g d'éthanol.