

NOTICE

Mis à jour : 27/02/2012

Dénomination du médicament

BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer
Lévomenthol / extrait de réglisse (sec)

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?
3. COMMENT PRENDRE BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

A VISEE ANTISEPTIQUE
(R: système respiratoire)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé pour soulager les irritations de la gorge.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer dans les cas suivants:

- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- antécédents d'allergie au menthol ou aux autres composants de la pastille,
- hypertension artérielle en raison de la présence de suc de réglisse.

EN CAS DE DOUTE VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer:

Précautions d'emploi

Tenir compte de la teneur en acide glycyrrhizique (5,82 mg) par pastille, dans le cas d'autres apports en réglisse (boisson, confiseries).

En cas de survenue de fièvre et/ ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...): **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Laisser fondre lentement les pastilles dans la bouche sans les croquer.

Ne dépassez pas la posologie maximale de 20 pastilles par jour chez l'adulte et 10 pastilles par jour chez l'enfant.

Adulte:

10 à 20 pastilles par jour.

Enfant de 6 à 15 ans:

5 à 10 pastilles par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE:

- *IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.*
- *NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.*

Mode et voie d'administration

Laisser fondre lentement les pastilles dans la bouche sans les croquer.

Voie buccale.

Durée du traitement

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer que vous n'auriez dû:

Un surdosage éventuel risque d'entraîner des effets comprenant des céphalées, des troubles du rythme cardiaque et de la fatigue musculaire.

En outre cette spécialité contient des terpènes (lévomenthol) qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents à type neurologique, à type de convulsions chez l'enfant (notamment en cas d'antécédents de convulsions).

Si vous avez pris plus de BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer que vous n'auriez dû, veuillez contacter votre médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- éruptions cutanées: dans ce cas, arrêtez le traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer ?

La substance active est:

Lévomenthol	1,40
mg	
Extrait aqueux sec de réglisse	97,02
mg	
(Quantité correspondante en glycyrrhizine	7,70
mg)	

Pour une pastille à sucer.

Les autres composants sont:

Maltodextrine 30 E, maltodextrine 005 BX.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que BLACKOIDS DU DOCTEUR MEUR, pastille à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pastille à sucer en sachet de 20 g ou en boîte de 20 g ou 50 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES
5, RUE DU GABIAN

IMMEUBLE "LE TRITON"
98000 MONACO

Exploitant

LABORATOIRES S.E.R.P.
3, RUE PRINCESSE FLORESTINE
98000 MONACO

Fabricant

LABORATOIRES S.E.R.P.
3, RUE PRINCESSE FLORESTINE
98000 MONACO

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.