

EXTRANASE[®] 900 nK

Bromélaïnes



IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination

Extranase 900 nK, comprimé enrobé gastro-résistant

Composition qualitative et quantitative

Pour un comprimé enrobé gastro-résistant :

Bromélaïnes 900 nanokatalas

Excipients: hydrogénophosphate de calcium anhydre, macrogol 4000, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium, lactose, acétophtalate de cellulose, phtalate de diéthyle, gomme laque, gomme arabique, bétacarotène (E160), saccharose, dioxyde de titane (E171), polysorbate 60, cire de carnauba, cire d'abeille blanche.

Forme pharmaceutique

Comprimé enrobé gastro-résistant, boîte de 40 ou 80.

Classe pharmaco-thérapeutique

Enzymothérapie à visée anticédémateuse

(M. Système locomoteur)

Nom et adresse de l'exploitant

Rottapharm

83-85 Bd Vincent Auriol

75013 Paris

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Traitement d'appoint des œdèmes consécutifs à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

ATTENTION!

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des composants,
- Enfant de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse-allaitement

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien **avant** de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

La posologie quotidienne, à titre indicatif est :

Adultes : 3 comprimés 3 fois par jour.

Chez l'enfant de 6 à 15 ans : 1 comprimé 3 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau sans les écraser.

Durée du traitement

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS: notamment risque d'allergie nécessitant l'arrêt du traitement.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

À CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE NE DÉPASSANT PAS 30°C. NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 2001



ROTTAPHARM

83-85 Bd Vincent Auriol 75013 PARIS

L1015C

texte CIE00P/D