

## **Dénomination du médicament**

### **MERCRYL, solution pour application cutanée Chlorure de benzalkonium/Digluconate de chlorhexidine**

#### **Encadré**

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### **Sommaire notice**

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MERCRYL, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYL, solution pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER MERCRYL, solution pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MERCRYL, solution pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### **1. QU'EST-CE QUE MERCRYL, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

##### **Classe pharmacothérapeutique**

ANTISEPTIQUE (D. Dermatologie)

##### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un antiseptique. Il est utilisé pour l'antisepsie et le nettoyage des petites plaies superficielles.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYL, solution pour application cutanée ?**

##### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Pour un bon usage du médicament: Il est important de respecter les conseils de cette notice. Si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
--

##### **Contre-indications**

N'utilisez jamais MERCRYL, solution pour application cutanée, dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6
- Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles,
- Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

## **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

Mises en garde et précautions d'emploi

En cas d'utilisation sur une grande surface, sous pansement occlusif (imperméable à l'eau et à l'air), sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson, il existe des risques de passage dans la circulation générale.

Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés. MERCRYL, solution pour application cutanée, peut provoquer des brûlures chimiques cutanées.

Utiliser proprement et ne pas garder longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès l'ouverture

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## **Interactions avec d'autres médicaments**

Autres médicaments et MERCRYL, solution pour application cutanée

· MERCRYL, solution pour application cutanée ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques, car ensemble ils risquent d'irriter votre peau ou d'être moins efficaces.

· Si vous utilisez du savon, rincez soigneusement avant d'appliquer MERCRYL, solution pour application cutanée.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre un autre médicament.

## **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

## **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

## **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

Grossesse et allaitement

N'appliquez pas MERCRYL, solution pour application cutanée sur les seins pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notable**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER MERCRYL, solution pour application cutanée ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Posologie/Mode d'administration

MERCRYL, solution pour application cutanée s'utilise 1 ou 2 fois par jour, pendant 7 à 10 jours.

L'application doit durer au moins une minute, pour laisser agir le médicament.

Sur la peau: appliquez MERCRYL, solution pour application cutanée directement sur la plaie avec une compresse stérile.

Sur les muqueuses (génitales): diluez MERCRYL, solution pour application cutanée avec de l'eau: dans un récipient propre, versez 1 volume de solution, et ajoutez 9 volumes d'eau (soit par exemple 1 cuillère à soupe de solution et 9 cuillères à soupe d'eau).

Puis appliquez la solution diluée sur la plaie.

Attention: la solution diluée doit être préparée juste avant d'être utilisée et ne doit pas être conservée.

NE PAS AVALER

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

· Possibilité d'eczéma de contact (rougeur et démangeaison) en raison de la présence de chlorure de benzalkonium.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER MERCRYL, solution pour application cutanée ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon.

### **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

Ce que contient MERCRYL, solution pour application cutanée

Les substances actives sont:

Chlorure de benzalkonium..... 0,500 g

Sous forme de solution de chlorure de benzalkonium ..... 0,985 g

Digluconate de chlorhexidine..... 0,200 g

Sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine..... 1,065 g

Pour 100 ml.

Les autres composants sont:

Acide citrique monohydraté, le citrate de sodium, l'eau purifiée.

### **Forme pharmaceutique et contenu**

Aspect de MERCRYL, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.

Flacon de 125 ml ou 300 ml.

### **Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

Titulaire

MENARINI FRANCE

1-7 RUE DU JURA

94633 RUNGIS CEDEX

Exploitant

MENARINI FRANCE

1-7, RUE DU JURA

94633 RUNGIS CEDEX

Fabricant

LABORATOIRES CHEMINEAU

93 ROUTE DE MONNAIE

37210 VOUVRAY

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}

### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

## **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

## **Autres**

Sans objet.

[Pharmacie de la Thure](#)