

NausiCalm

15,7 mg

Enfants



Sirup en sachet

NausiCalm 15,7 mg enfants

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour le traitement de votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirup en sachet, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirup en sachet ?
3. Comment prendre NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirup en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirup en sachet ?
6. Informations supplémentaires.
7. Conseils pour une bonne utilisation de ce médicament.

1 QU'EST-CE QUE NAUSICALM 15,7 MG ENFANTS, SIROP EN SACHET, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que NAUSICALM 15,7 MG ENFANT, SIROP EN SACHET ?

Classe pharmacothérapeutique – antinaupathique (N : système nerveux central).

Ce médicament appartient à la famille de médicaments appelée les antihistaminiques. L'histamine est un composant naturel qui joue un rôle important dans les nausées, les vomissements et le mal des transports. La substance active de ce médicament agit en bloquant la libération d'histamine dans l'organisme.

Dans quels cas ce médicament est-il utilisé ?

Ce médicament est utilisé :

- pour prévenir et traiter le mal des transports chez l'enfant de 6 à 15 ans,
- pour traiter les nausées et les vomissements passagers (pas plus de 2 jours) sans fièvre chez l'enfant de 6 à 15 ans.

au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions allergiques.
- Ce médicament contient 106 mg d'éthanol (alcool) par sachet. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
- Par prudence, ne donnez pas ce médicament si votre enfant a un asthme bronchique.
- En cas de maladie au long cours du foie ou des reins, votre médecin devra adapter la dose à son état.

La survenue de signes ou symptômes évoquant un usage abusif ou une pharmacodépendance du dimenhydrinate doit faire l'objet d'une surveillance attentive.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient un antihistaminique, le dimenhydrinate. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose maximale recommandée.

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Bien que ce médicament soit réservé aux enfants de 6 à 15 ans, les recommandations suivantes sont données à titre d'information :

Vous devez éviter de consommer de l'alcool ou des boissons alcoolisées car cela peut accentuer les somnolences qui peuvent être provoquées par ce médicament.

Vous devez vous adresser à votre médecin en l'absence d'amélioration ou si vous vous sentez moins bien au-delà de 2 jours.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NAUSICALM, 15,7 MG ENFANTS, SIROP EN SACHET ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne donnez jamais NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet :

- Si votre enfant est allergique (hypersensible) à la substance active (le dimenhydrinate) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet (les antihistaminiques) utilisé pour traiter les allergies.
- Si votre enfant a un glaucome (causé par une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil).
- Si votre enfant a des difficultés à uriner.
- Si votre enfant a moins de 6 ans. Les nausées et les vomissements survenant chez l'enfant de moins de 6 ans peuvent avoir des origines diverses. Dans ce cas, vous devez amener votre enfant consulter un médecin.

Précautions d'emploi avec 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet

- Ce médicament contient 3,6 g de saccharose par sachet. Vous devez en tenir compte si votre enfant suit un régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance

Grossesse et allaitement

Bien que ce médicament soit réservé aux enfants de 6 à 15 ans, les recommandations suivantes sont données à titre d'information :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

En fin de grossesse, ce médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, vous devez toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et ne dépasser en aucun cas la dose recommandée.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par conséquent, il est déconseillé de l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Bien que ce médicament soit réservé aux enfants de 6 à 15 ans, les recommandations suivantes sont données à titre d'information :

Ce médicament peut provoquer une somnolence et une baisse de la vigilance. Vous ne devez pas conduire ou utiliser une machine si vous ressentez l'un de ces effets.

Ces effets seront accentués si vous consommez des boissons alcoolisées ou un médicament contenant de l'alcool.

Informations importantes concernant certains composants de NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet

Ce médicament contient un sucre (le saccharose), du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) ainsi que de l'éthanol (contenu dans l'arôme caramel)

3 COMMENT PRENDRE NAUSICALM, 15,7 MG ENFANTS, SIROP EN SACHET ?

Si vous donnez ce médicament pour prévenir ou traiter le mal des transports

- Chez l'enfant de 6 à 15 ans : la dose à utiliser est de 1 à 2 sachets. Vous ne devez pas dépasser 10 sachets par jour (soit 150 mg / jour).

Si vous donnez ce médicament pour traiter des nausées et des vomissements sans fièvre

- Chez l'enfant de 6 à 15 ans : la dose est de 1 à 2 sachets toutes les 6 à 8 heures. Vous ne devez pas dépasser 10 sachets par jour (soit 150 mg/ jour).

Mode d'administration

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Fréquence d'administration

Si vous donnez NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet pour prévenir le mal des transports, administrez-le une demi-heure avant le départ.

Au cours du voyage, sa prise peut éventuellement être renouvelée, sans dépasser les doses maximales recommandées.

Durée du traitement

- Pour traiter les nausées et les vomissements sans fièvre : ne dépassez pas 2 jours de traitement. Si les troubles persistent au-delà de 2 jours, consultez votre médecin.
- Pour prévenir et traiter le mal des transports : utilisez ce médicament uniquement avant et éventuellement pendant le transport.

Si vous avez donné plus de NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet que vous n'auriez dû :

Des malaises ou des troubles de la conscience peuvent survenir.

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de donner NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet, ne donnez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de donner.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant ces effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5 COMMENT CONSERVER NAUSICALM, 15,7 MG ENFANTS, SIROP EN SACHET ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet après la date de péremption mentionnée sur le sachet et la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet ?

- La substance active est : le dimenhhydrinate (0,0157 g par sachet).
- Les autres composants sont : le saccharose, l'arôme caramel (contenant notamment de l'éthanol), le parahydroxybenzoate de méthyle (E218), le parahydroxybenzoate de propyle (E216), la gomme xanthane et l'eau purifiée.

Qu'est ce que NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop en sachet de couleur jaune ambrée à odeur de caramel. Chaque boîte contient 15 sachets de 5 ml.

Titulaire / Exploitant/ Fabricant

Les Laboratoires Nogues

43, rue de Neuilly

92735 Nanterre Cedex – France

4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NAUSICALM 15,7 mg ENFANTS, sirop en sachet est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets suivants peuvent survenir et nécessitent d'arrêter immédiatement le traitement et de prévenir son médecin :

- Une allergie. Vous la reconnaîtrez par des boutons, des démangeaisons, des rougeurs sur la peau, un brusque gonflement du cou et du visage pouvant entraîner une gêne respiratoire. Si l'un de ces symptômes apparaît, arrêtez le médicament et contactez immédiatement votre médecin.
- Une fièvre accompagnée ou non de signes d'infection. Il peut alors s'agir d'une baisse importante des globules blancs dans le sang.
- Des saignements de nez ou des gencives. Il peut alors s'agir d'une baisse anormale du nombre de plaquettes dans le sang.

D'autres effets peuvent survenir :

- Une somnolence, une baisse de la vigilance, des troubles de la mémoire ou de la concentration.
- Des vertiges, des troubles de l'équilibre, des troubles des mouvements (incoordination motrice), des tremblements.
- Une confusion, des hallucinations.
- Une sécheresse de la bouche.
- Des troubles de la vue.
- Des difficultés pour uriner (rétention urinaire).
- Une constipation.
- Des palpitations du cœur, une baisse de la tension artérielle
- Plus rarement, des signes d'excitation (agitation, nervosité, insomnie)
- Encore plus rarement, des mouvements anormaux de la tête et du cou

7 CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DE CE MEDICAMENT

- Les nausées et les vomissements sont des symptômes courants. Ils peuvent survenir si vous avez senti une mauvaise odeur, si vous avez avalé un aliment que votre estomac n'accepte pas ou si vous avez le mal des transports.
- Si vous avez des vomissements, il faut penser à boire, ou à faire boire l'enfant, beaucoup et souvent, des boissons salées ou sucrées pour compenser la perte de liquide causée par les vomissements.

Cependant :

- Si d'autres troubles apparaissent (douleur et/ou fièvre), ou s'ils se répètent,
- Si les vomissements sont accompagnés de bile ou de sang,
- Si les nausées et vomissements persistent plus de 2 jours malgré le traitement,
- Si les nausées et vomissements s'aggravent, **consultez immédiatement votre médecin car il peut s'agir d'une maladie grave.**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 12 janvier 2017.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) : www.ansm.sante.fr