

# ASCATRYL TRIO BIOCANINA GRAND CHIEN L/XL

## Identification

### Dénomination du médicament vétérinaire

ASCATRYL TRIO BIOCANINA GRAND CHIEN L/XL

### Forme pharmaceutique

Comprimé

## Composition

### Principes actifs

- Pyrantel (sous forme d'embonate)
- Praziquantel
- Fébantel
- Arôme de boeuf
- Amidon de maïs
- Lactose monohydraté
- Cellulose microcristalline
- Povidone 25
- Stéarate de magnésium
- Laurylsulfate de sodium
- Silice colloïdale anhydre

### Excipients

## Usage clinique

### Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
• Chien	<p><b>Chez les chiens pesant plus de 17,5 kg.</b></p> <p>Affections à parasites sensibles au fébantel, au pyrantel et au praziquantel.</p> <p>Chez les chiens polyparasités :</p> <p>- Traitement curatif des infestations par :</p> <p>les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures suivants :</p> <p><i>Trichuris vulpis</i></p> <p><i>Ancylostoma caninum</i></p> <p><i>Uncinaria stenocephala</i></p> <p><i>Toxocara canis</i></p> <p><i>Toxascaris leonina</i></p> <p>les cestodes gastro-intestinaux adultes et immatures suivants :</p>

Espèce(s)	Utilisation
	<i>Taenia spp</i> <i>Dipylidium caninum</i>

## Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients

Ne pas administrer aux chiennes gestantes durant les quatre premières semaines de gestation.

## Précautions et mises en garde

### Mise en garde particulière à chaque espèce cible

Une utilisation inutile d'antiparasitaires ou une utilisation en dehors des recommandations du RCP peut augmenter la pression de sélection de la résistance et conduire à une efficacité réduite. La décision d'utiliser le produit doit être fondée sur la confirmation de l'espèce de parasite et de la charge parasitaire, ou du risque d'infestation sur la base de ses caractéristiques épidémiologiques, pour chaque animal selon le parasite cible.

L'utilisation de ce produit doit tenir compte des informations locales sur la sensibilité des parasites cibles, lorsqu'elles sont disponibles.

Les cas cliniques avec suspicion de résistance aux anthelminthiques doivent faire l'objet d'études supplémentaires par le biais de tests appropriés.

Une résistance avérée doit être signalée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou aux autorités compétentes.

En l'absence de risque de co-infection, un produit à spectre étroit doit être utilisé, quand cela est possible

### Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles

Sans objet.

### Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament

Sans objet.

### Précautions particulières concernant la protection de l'environnement

Sans objet

### Autres précautions

Aucune.

# Interactions et cas particuliers

## Utilisation en cas de gravité, de lactation ou de ponte

Ne pas administrer aux chiennes gestantes durant les quatre premières semaines de gestation.

## Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Ne pas administrer simultanément avec un autre vermifuge contenant de la pipérazine comme matière active.

## Anti-microbiens et anti-parasitaires : lutte contre les résistances

Sans objet.

## Effets indésirables et surdosage

### Incompatibilité majeure

Voir rubrique "Interactions médicamenteuses et autre forme d'interaction"

### Effets indésirables

Non connus.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir également la rubrique « coordonnées » de la notice.

## Posologie

Espèce(s)	Posologie	
• Chien	15 mg de fébantel, 5 mg de pyrantel (sous forme d'embonate) et 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel, soit 1 comprimé pour 10 kg en une prise unique, suivant le schéma posologique suivant :	
Poids de l'animal (kg)	Nombre de comprimés	
17,5	½	
17,5 - 35	1	
35 - 52,5	1 ½	
52,5 - 70	2	
Afin de garantir une posologie appropriée, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.		

Espèce(s)	Posologie

## Temps d'attente

### Voie d'administration

- Orale

## Conservation et stockage

### Température de conservation

Non renseigné

### Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

### Précaution particulière à prendre lors de l'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

## Informations commerciales

Présentation	Accessible au groupement	Classement du médicament en matière de délivrance	Numéro d'autorisation de mise sur le marché
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 2 comprimés sécables	Non	Non soumis à prescription	FR/V/5388265 9/2003

## Informations de révision

### Date de révision de la notice

24/07/2024 00:00

## Responsabilités

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**Laboratoire VETOQUINOL S.A.**

VETOQUINOL S.A.

34 rue du chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois

VETOQUINOL France

37, rue de la Victoire

75009 PARIS

Service clients : +33 3 84 62 56 56

<http://www.vetoquinol.fr>

**Responsable de la mise sur le marché**

**DÔMES PHARMA FR - Gamme BIOCANINA**

*DÔMES PHARMA FR - Division Officine - Gamme BIOCANINA 57, Rue des Bardines 63370  
LEMPDES*

<https://www.biocanina.com/>

**Responsable de la pharmacovigilance**

**DÔMES PHARMA FR - Gamme BIOCANINA**

*DÔMES PHARMA FR - Division Officine - Gamme BIOCANINA 57, Rue des Bardines 63370  
LEMPDES*

<https://www.biocanina.com/>