



# SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE GIFRER

Famille du médicament : Laxatif par voie rectale

## Dans quel cas le médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER est-il prescrit ?

C'est un laxatif administré par voie rectale. Il déclenche une contraction du rectum qui permet l'évacuation des selles.

Il est utilisé dans le traitement de la constipation, notamment lorsque les selles s'accumulent dans le rectum et que les poussées répétées ne permettent pas de les évacuer. Il est également utilisé pour préparer le rectum avant un examen endoscopique (rectoscopie).

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Constipation chez l'adulte
- Constipation chez l'enfant

## Présentations du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER Adulte : suppositoire ; boîte de 10

- Non remboursé - Prix libre

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER Adulte : suppositoire ; boîte de 25 (en sac)

- Non remboursé - Prix libre

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER Adulte : suppositoire ; boîte de 50 (en sac)

- Non remboursé - Prix libre

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER Adulte : suppositoire ; boîte de 100 (en sac)

- Non remboursé - Prix libre

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER Enfant : suppositoire ; boîte de 10

- Non remboursé - Prix libre

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER Nourrisson : suppositoire ; boîte de 10

- Non remboursé - Prix libre

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

## Composition du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER

	p suppos Ad	p suppos Enf	p suppos Nour
Glycérol	1,98 g	1,25 g	0,65 g

Substance active : Glycérol

Excipients : Eau purifiée, Gélatine

## Contre-indications du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- douleurs abdominales de cause inconnue,

- maladies inflammatoires du côlon.

## Attention

Les laxatifs administrés par voie rectale ne doivent pas être utilisés de façon prolongée sans avis médical : ils risquent d'empêcher le réflexe normal d'expulsion des selles.

Des précautions sont nécessaires chez la personne atteinte d'hémorroïdes, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique.

## Fertilité, grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé de façon ponctuelle pour traiter la constipation de la femme enceinte ou qui allaite.

## Mode d'emploi et posologie du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER

L'effet laxatif se manifeste après un délai de 5 à 30 minutes.

### Posologie usuelle :

- Adulte : 1 suppositoire Adulte par jour, à renouveler dans l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.
- Enfant de plus de 6 ans : 1 suppositoire Enfant par jour, à renouveler éventuellement dans l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.
- Enfant de 2 à 6 ans : 1 suppositoire Enfant par jour.
- Nourrisson : 1 ou 2 suppositoires Nourrisson par jour.

## Conseils

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

## Effets indésirables possibles du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE GIFRER

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et, exceptionnellement, des inflammations du rectum.

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en ligne.

Médicament commercialisé par le laboratoire Gifrer Barbezat

## Lexique :

Terme	Définition
constipation	Ralentissement du transit intestinal se traduisant par la raréfaction des selles. Consultez l'article : Constipation de l'adulte ou Constipation de bébé et de l'enfant
excipient	Substance sans activité thérapeutique entrant dans la composition du médicament ou utilisée pour sa fabrication. L'excipient a pour fonction d'améliorer l'aspect ou le goût, d'assurer la

	<p>conservation, de faciliter la mise en forme et l'administration du médicament. Il sert aussi à acheminer la substance active vers son site d'action et à contrôler son absorption par l'organisme.</p> <p>L'excipient devrait avoir une innocuité parfaite (être bien toléré) ; néanmoins certains peuvent entraîner des réactions allergiques ou des intolérances individuelles : il s'agit des excipients à effet notoire.</p> <p>Consultez l'article : Les excipients à effet notoire</p>
fissure anale	Petite crevasse du pourtour de l'anus, souvent peu ou pas visible, provoquant des douleurs vives pendant et après la selle.
hémorroïde	<p>Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.</p> <p>Consultez l'article : Hémorroïdes</p>
inflammation	Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.
nourrisson	Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.
rectocolite hémorragique	<p>Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.</p> <p>Consultez l'article : Rectocolite hémorragique.</p>
rectoscopie	Technique d'examen visuel de l'intérieur du rectum au moyen d'un tube optique (rectoscope).
voie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.</li> <li>• Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.</li> </ul>



L'intelligence médicale  
au service du soin © Vidal 2023