

Gamme de médicament **STORINYL**

Mise à jour : 11 mars 2022

ferrum phosphoricum [H]

hydrastis canadensis [H]

[Afficher plus](#)

Information patient

Cette information est destinée au grand public. Elle est rédigée par les experts Vidal dans un esprit d'accessibilité et de bonne compréhension, à partir de l'information officielle et des données de la littérature scientifique. Elle ne constitue en aucun cas une base d'information à usage professionnel et ne doit pas être utilisée comme référentiel de prescription ou de délivrance de médicament.

STORINYL

Fiche révisée le 11 mars 2022

Famille du médicament : **Homéopathie**

Dans quel cas le médicament STORINYL est-il prescrit ?

Ce médicament est un complexe (association) de composants homéopathiques.

Il est traditionnellement utilisé dans le traitement homéopathique du rhume et de la toux.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- [Rhinopharyngite de l'enfant](#)
- [Rhume](#)

Présentations du médicament STORINYL

STORINYL : sirop ; flacon de 200 ml avec doseur gradué

Ordonnance facultative- Non Remboursé - Prix libre

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « [honoraires de dispensation](#) » du pharmacien.

Composition du médicament STORINYL

Dulcamara 5 CH, Ferrum phosphoricum 9 CH, Hydrastis canadensis 9 CH, Kalium bichromicum 9 CH, Nux vomica 9 CH, aa ; saccharose (4,3 g par dose de 5 ml), benzoate de sodium.

Substances actives : [Ferrum phosphoricum](#), [Hydrastis canadensis](#), [Kalium bichromicum](#), [Nux vomica](#), [Solanum dulcamara](#)

La liste des excipients est consultable sur la page produit de chaque médicament de la gamme (pour la consulter, cliquer sur un nom du médicament).

Attention

La toux est un symptôme qui peut révéler de nombreuses maladies : consultez votre médecin si elle persiste plus de quelques jours.

Ce sirop contient du sucre (saccharose) en quantité notable.

Fertilité, grossesse et allaitement

Aux dilutions homéopathiques, les substances contenues dans ce médicament ne sont pas connues pour être toxiques pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 dose de 15 ml, 3 à 5 fois par jour.
- Enfant de 2 à 12 ans : 1 dose de 5 ml, 3 fois par jour.
- Enfant de moins de 2 ans : 1 dose de 5 ml à diluer dans un peu de liquide, 3 fois par jour.

Les prises doivent être espacées dès amélioration des symptômes.

La durée de traitement ne doit pas dépasser 1 semaine.

Conseils

Des mesures simples permettent de calmer les toux sèches : boissons chaudes et humidification de l'air ambiant.

Le flacon ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.

Effets indésirables possibles du médicament

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le [déclarer en ligne](#).

Médicament commercialisé par le [laboratoire Boiron](#)

Publicité

Commentaires

Ajouter un commentaire

Caractères : 0/3000 *Commenter en tant que*

Commenter

En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté **les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires"**. Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le **déclarant en ligne**.

Spécialité de la gamme

VOIE ORALE

FICHE ABRÉGÉE

STORINYL sirop

Non Remb.

COMMERCIALISÉ

