



# SYNTHOL

SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE

Solution pour application cutanée

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE-QUE SYNTHOL, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE SYNTHOL, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

AUTRES TOPIQUES POUR DOULEURS ARTICULAIRES ET MUSCULAIRES, code ATC: M02AX10

Ce médicament est préconisé, CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS en application cutanée, en traitement d'appoint des :

- traumatismes bénins : bleus, coups
- piqures d'insectes

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?**

---

### **N'utilisez jamais SYNTHOL, solution pour application cutanée, dans les cas suivants :**

- Antécédent d'allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des constituants.
- Enfants et les sujets âgés ayant des antécédents de convulsions (fébriles ou non) en raison de la présence de dérivés terpéniques (lévomenthol).
- **Ne pas appliquer sur les yeux, sur une peau lésée quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.**

### **Faites attention avec SYNTHOL, solution pour application cutanée:**

Ce médicament est RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques (lévomenthol) qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents à type de convulsions chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation :

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (Voir rubrique 3. COMMENT UTILISER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées,
- ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

Après application, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux.

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Grossesse et allaitement :**

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **3. COMMENT UTILISER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?**

**MODE D'ADMINISTRATION :** voie cutanée. Ne pas avaler.

**POSOLOGIE/FREQUENCE D'ADMINISTRATION :** 2 à 3 fois par jour.

**Utilisation cutanée en compresses ou en frictions (traumatismes bénins ou piqûres d'insectes) :**

- En compresses, diluer ce produit à 50% avec de l'eau. Le temps d'application de la compresse imprégnée de la solution diluée **sur la peau** varie de 1/2 heure à 1 heure maximum.
- En frictions, le produit est utilisé pur.

**Se laver les mains après application.**

**Durée de traitement:** en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement, consultez votre médecin.

**Si vous avez utilisé plus de SYNTHOL, solution pour application cutanée, que vous n'auriez dû :** rincer abondamment à l'eau.

**Si vous oubliez de prendre SYNTHOL, solution pour application cutanée :** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, SYNTHOL, solution pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Risque de réaction locale.
- De rares cas d'eczéma de contact nécessitant l'arrêt du traitement ont été rapportés. Possibilité de rougeur cutanée au point d'application.
- En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :
  - risque de convulsions chez l'enfant,
  - possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.
- En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER SYNTHOL, solution pour application cutanée ?**

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser SYNTHOL, solution pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Pour les flacons : à conserver dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.



Pour le spray : à conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de la lumière.  
Au dessous de +8°C, une légère opalescence peut apparaître. La solution redevient limpide dès que la température ambiante remonte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **Ce que contient SYNTHOL, solution pour application cutanée**

Les substances actives sont :

Lévomenthol.....0,2600 g

Vératrole.....0,2600 g

Résorcinol.....0,0210 g

Acide salicylique.....0,0105 g

Pour 100 g de solution.

Les autres composants sont : l'huile essentielle de géranium rosat, l'huile essentielle de cédrat, le jaune de quinoléine (E 104), l'éthanol à 96%, l'eau purifiée.

Titre alcoolique: 35,0° (V/V).

### **Qu'est-ce que SYNTHOL, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée. Flacon de 115ml, 225ml ou 450ml ou flacon pulvérisateur de 75ml ou 125ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT :**

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

100 route de Versailles - CS 80001

78164 Marly-le-Roi Cedex (France)

### **NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :**

Farmaclair

440, avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair (France)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Octobre 2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'ANSM (France).