

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

Classe pharmacothérapeutique :

Ce médicament appartient à la classe des enzymes à visée anti-inflammatoire.

Précautions d'emploi et mises en garde :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec ALFA-AMYLASE BIOGARAN CONSEIL 200 U.CEIP-ml, sirop:

Mises en garde spéciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 3,2 g de saccharose par cuillère à café (5 ml) et 9,6 g de saccharose par cuillère à soupe (15 ml), dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) et du parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

En cas de survenue de signes généraux d'infection comme:

- fièvre élevée (> 38,5°C) et persistante (plus de 3 jours),
- apparition d'autres symptômes comme: maux de gorge ou de tête importants, nausées, vomissements, douleurs ou écoulement de l'oreille, douleur de la face,
- persistance des symptômes sans amélioration, au-delà de 5 jours.

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et Allaitement :

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Composition :

Excipients à effet notoire : Glucose,

Substances actives :

Alfa amylase 200 U.CEIP*

Pour 1 ml.

*Soit 142,86 unités Pharmacopée Européenne par ml de sirop.

Autres substances : Saccharose, glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, parahydroxybenzoate de propyle sodique, huile essentielle de mandarine, acide citrique monohydraté et eau purifiée.

ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop

Liste complète des substances actives et des excipients

La substance active est :

Alfa amylase..... 200 U.CEIP*
pour 1 ml

* soit 142,86 unités Pharmacopée Européenne par ml de sirop.

Les autres composants sont :

saccharose, glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, parahydroxybenzoate de propyle sodique, huile essentielle de mandarine, acide citrique monohydraté et eau purifiée.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

TOP PHARM

DOMAINE DE MONTCAUSSON
B.P. 50
31250 REVEL

Exploitant
BIOGARAN

15, boulevard charles de gaulle
92707 COLOMBES CEDEX

Fabricants

Laboratoires PASQUIER
ZI DE SIGNARGUES

R.N. 100
30390 DOMAZAN

ou

Laboratoires DELPHARM TOURS
RUE PAUL LANGEVIN

BP90241
37172 CHAMBRAY LES TOURS

1. QU'EST-CE QUE ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Forme pharmaceutique et contenu ; classe pharmacothérapeutique

Ce médicament se présente sous la forme d'un sirop en flacon de 125 ml, 200 ml, 250 ml ou 300 ml.

Indications thérapeutiques

Ce médicament appartient à la classe des enzymes à visée anti-inflammatoire.

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne pas utiliser ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à l'alfa-amylase ou à l'un des composants de la solution, notamment les parabens.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Prendre des précautions particulières avec ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

Interactions avec les aliments et les boissons

En cas de régime pauvre en sucre ou de diabète, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de saccharose :

- une cuillère à café contient 3,2 g de saccharose,
- une cuillère à soupe contient 9,6 g de saccharose.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, glycérol.

Interaction avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement, Mode et/ou voie(s) d'administration

Voie orale.

Adulte : 1 cuillère à soupe (15 ml), 3 fois par jour.

Enfant de plus de 3 ans (plus de 15 kg) : 2 cuillères à café (10 ml), 3 fois par jour.

Nourrisson et enfant de 6 mois à 3 ans (7kg à 15 kg) : 1 cuillère à café (5 ml), 3 fois par jour.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- Réactions allergiques : dans ce cas, arrêtez le traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALFA-AMYLASE BIOGARAN 200 U.CEIP/ml, sirop ?

Conditions de conservation et date de péremption

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}