

GASTROPAX,

poudre pour solution buvable

Carbonate de calcium, Trisilicate de magnésium, Carbonate de magnésium léger, Kaolin lourd, Bicarbonate de sodium, Hydroxyde de magnésium, Phosphate tricalcique.

1 - DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans les douleurs et les brûlures de l'œsophage ou dans les douleurs, les brûlures et les aigreurs de l'estomac.

2 - ATTENTION ! DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de :

- antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- maladie rénale grave,
- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec des quinidiniques.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales

Si les troubles ne disparaissent pas en une dizaine de jours, si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter votre médecin.

Précautions d'emploi

Éviter le tabac, les boissons alcoolisées, les repas trop épicés, le stress, certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires) pouvant entraîner des brûlures ou aigreurs d'estomac. En cas de maladie rénale ou de dialyse chronique, consulter votre médecin.

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de la teneur en sodium (164 mg par cuillère à café).

En cas de doute ne pas hésiter à

demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment avec les quinidiniques, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments.

Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre l'antiacide et un autre médicament.

Grossesse-allaitement

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Ce médicament peut être administré pendant l'allaitement si besoin.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

3 - COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Diluer dans un verre d'eau, 1 cuillère à café au moment des douleurs (pas plus de 6 prises par jour).

Il est habituellement inutile de dépasser cette posologie.

Si celle-ci ne suffit pas à vous calmer, consultez votre médecin.

Ce médicament vous a été personnellement délivré dans une situation précise :

- il peut ne pas être adapté à un autre cas.

- ne pas le conseiller à une autre personne.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- troubles du transit (constipation/diarrhée),
- à fortes doses et prolongées, risque de diminution de la quantité de phosphore dans l'organisme, survenue possible de calculs et de troubles rénaux graves. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5 - CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Date de révision de la notice

Décembre 1997.

6 - COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Les substances actives sont :

Carbonate de calcium	20 g,
Trisilicate de magnésium	20 g,
Carbonate de magnésium léger	20 g,
Kaolin lourd	15 g,
Bicarbonate de sodium	15 g,
Hydroxyde de magnésium	6 g,
Phosphate tricalcique	3 g.

Excipient : teinture de badiane.
Pour 100 g de poudre pour solution buvable.

1 cuillère à café contient 4 g de poudre soit 360 mg de calcium, 392 mg de magnésium et 164 mg de sodium.

Forme pharmaceutique

Poudre pour solution buvable, boîte de 100 g.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIACIDE (A : Appareil digestif et métabolisme).



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



LEHNING
LABORATOIRES