

LOMEXIN® 2 pour cent, crème

Nitrate de fenticonazole

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 - Qu'est-ce que LOMEXIN® 2 pour cent, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?
- 3 - Comment utiliser LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?
- 6 - Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LOMEXIN® 2 pour cent, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique
ANTIFONGIQUE LOCAL

IMIDAZOLE

(D. Dermatologie)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées ou des muqueuses (mycoses), dues à des champignons microscopiques (candidoses, dermatophyties, pityriasis versicolor).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?

N'utilisez jamais LOMEXIN® 2 pour cent, crème dans le cas suivant :

- allergie à l'un des composants (ou sensibilité croisée avec les autres membres du groupe des imidazolés).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec LOMEXIN® 2 pour cent, crème :

Mises en garde spéciales

Une utilisation prolongée peut provoquer des réactions de sensibilisation, ou de l'irritation.

Si de telles réactions apparaissent, l'utilisation du produit doit être interrompue.

Précautions d'emploi

- Éviter le contact avec l'œil.
- Prévenez votre médecin en cas d'antécédents allergiques aux imidazolés.
- Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).
- Ce médicament contient de l'alcool cétylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).
- Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients à effet notoire

Propylèneglycol, lanoline hydrogénée, alcool cétylique.

3. COMMENT UTILISER LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?

Posologie

Appliquez régulièrement la crème sur les lésions à traiter, une fois par jour pendant la durée recommandée par le médecin selon la mycose.

Conseils pratiques :

- Dans le cas de Candidoses, la toilette est à effectuer avec un savon à pH neutre ou alcalin.

- En gynécologie, le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales...) et dans la mesure du possible, de la suppression de facteurs favorisants.

Ne pas interrompre le traitement pendant les règles

Mode et voie d'administration

Ceci est un médicament à usage local.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES

ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LOMEXIN® 2 pour cent, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- manifestations locales d'intolérance, démangeaison et irritation, sensation de brûlure, rougeurs,
- rarement, possibilité de passage du principe actif de ce médicament dans la circulation sanguine, en particulier lors d'applications sur une peau lésée, une surface étendue ou chez le nourrisson.

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LOMEXIN® 2 pour cent, crème après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de conditions de conservation particulières.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient LOMEXIN® 2 pour cent, crème ?

La substance active est :

Nitrate de fenticonazole	2,000 g
Quantité correspondant à	
fenticonazole base	1,757 g
Pour 100 g de crème	

Les autres composants sont :

Propylèneglycol, lanoline hydrogénée, huile d'amande, esters polyglycoliques d'acide gras (Xalifin 15), alcool cétylique, monostéarate de glycérol, édétate de sodium (E385), eau purifiée.

Qu'est-ce que LOMEXIN® 2 pour cent, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème ; tube de 15 g ou 30 g.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est septembre 2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

Information médicale : 01 41 28 20 20

Titulaire/Exploitant :



Laboratoires EFFIK
9-11 rue Jeanne Braconnier
92 366 Meudon la Forêt