

# Marga®

## MAUX D'ESTOMAC

### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

**DENOMINATION :** MARGA, comprimé à sucer.

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Oxyde d'aluminium hydraté ..... 100,0 mg  
Hydroxyde de magnésium..... 60,0 mg  
Carbonate de calcium..... 50,0 mg  
Excipients : Stéarate de magnésium, maltodextrine, saccharose, arôme menthe (huile essentielle de menthe poivrée, menthol naturel, maltodextrine, gomme végétale, sorbitol) pour un comprimé de 1,45 g.

### FORME PHARMACEUTIQUE :

Comprimé à sucer - Boîte de 48 comprimés sous plaquette thermoformée.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTIACIDES (A : Appareil digestif et métabolisme).

### TITULAIRE / EXPLOITANT :

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE - Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex

### FABRICANT :

DELPHARM Brétigny, Usine du Petit Paris, 91731 Brétigny Sur Orge Cedex.

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament est un antiacide. Il diminue l'acidité de l'estomac.

Il est préconisé dans les douleurs, brûlures, aigreurs de l'estomac ou de l'oesophage.

### ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale sévère.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### MISES EN GARDE SPECIALES :

Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin.

Si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter immédiatement votre médecin.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas de :

- dialyse chronique ; l'emploi de ce médicament doit être modéré,

- maladie des reins,

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Ce médicament est déconseillé avec les médicaments quinidiniques.

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

### **GROSSESSE - ALLAITEMENT :**

*D'UNE FACON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.*

### **LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :**

Saccharose (sucre) : 1,17 g par comprimé.

En tenir compte en cas de diabète ou de régime pauvre en sucre.

Sorbitol.

### **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :**

#### **POSOLOGIE :**

6 comprimés à sucer par 24 heures.

Si cette posologie ne suffit pas à calmer les troubles, consultez votre médecin.

#### **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : VOIE ORALE**

#### **FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE**

Les comprimés doivent être pris au moment des douleurs ou selon l'ordonnance de votre médecin ou après les repas.

**DUREE DU TRAITEMENT :** Pas d'utilisation au-delà de 7 jours sans avis médical.

#### **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :**

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :*

- risque de diarrhée lors de l'utilisation à forte dose,

- à dose forte et prolongée, survenue possible d'une quantité excessive de calcium dans le sang avec risque de calculs rénaux et de troubles rénaux graves, de diminution de la quantité de phosphore,

- risque d'affection neurologique chez les patients dialysés chroniques.

*SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE*

#### **CONSERVATION :**

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**DATE DE REVISION DE LA NOTICE :** Octobre 2007



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX