

FRONTCONTROL WORMER COMPRIMES POUR CHATS

Identification

Dénomination du médicament vétérinaire

FRONTCONTROL WORMER COMPRIMES POUR CHATS

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé

Composition

Principes actifs

- Embonate de pyrantel
- Praziquantel
- Amidon de maïs
- Cellulose microcristalline (E 460)
- Crospovidone
- Stéarate de magnésium (E 572)
- Silice colloïdale anhydre
- Arôme viande grillée
- Opadry Complete Film Coating System 03F28415 composé d'alcool polyvinyle, de dioxyde de titane (E171), de macrogol/PEG 3350 et de talc (E553b)

Excipients

Informations supplémentaires

230 mg d'Embonate de pyrantel est équivalent à 79,79 mg de pyrantel.

Comprimé pelliculé blanc à blanc cassé, biconvexe, avec une barre de sécabilité sur une face et plat sur l'autre face.

Le comprimé peut être divisé en deux parties égales.

Usage clinique

Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
• Chat	Chats : - Traitement des infestations mixtes par les nématodes et les cestodes des espèces suivantes : <u>Nématodes</u> : <i>Toxocara cati</i> , <i>Toxascaris leonina</i> .

Espèce(s)	Utilisation
	<u>Cestodes</u> : <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Taenia taeniaeformis</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> .

Contre-indications

Précautions et mises en garde

Mise en garde particulière à chaque espèce cible

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour un type fréquent de ténia (*Dipylidium caninum*).

Une infestation par un ténia réapparaîtra certainement si un contrôle des hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc... n'est pas entrepris.

En cas de risque de ré-infestation, l'avis d'un vétérinaire doit être demandé en ce qui concerne la nécessité et la fréquence d'administrations répétées chez le chat. Il faut tenir compte de la situation épidémiologique locale et des conditions de vie des chats. Il est également important de supprimer les sources possibles de ré-infestation telles que les puces et les souris.

La résistance des parasites à certaines classes d'anthelminthiques peut se développer suite à une utilisation fréquente ou répétée d'un anthelminthique de cette classe.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles

Les comprimés étant aromatisés, ils doivent être conservés dans un endroit sûr hors de portée des animaux.

Les animaux en mauvaise condition ou fortement parasités, et qui peuvent manifester des symptômes tels que diarrhée, vomissements, présence de parasites dans les selles ou les vomissements, mauvais état du pelage, doivent être examinés par un vétérinaire avant administration du produit.

Chez les chats sévèrement affaiblis ou fortement infestés, l'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament

Par mesure d'hygiène, les personnes administrant les comprimés directement au chat ou les ajoutant à sa nourriture, doivent se laver les mains après l'administration.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Précautions particulières concernant la protection de l'environnement

Sans objet.

Autres précautions

L'échinococcose est une maladie dangereuse pour l'Homme. Sa déclaration à l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) est obligatoire. Des protocoles spécifiques en termes de traitement, de suivi, et de protection des personnes, peuvent être obtenus auprès des autorités compétentes.

Interactions et cas particuliers

Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

Gestation et lactation :

Ne pas utiliser pendant la gestation mais peut être utilisé pendant la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la famille de la pipérazine.

Anti-microbiens et anti-parasitaires : lutte contre les résistances

Sans objet.

Effets indésirables et surdosage

Incompatibilité majeure

Aucune connue.

Effets indésirables

Espèces cibles: Chats :

Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les rapports isolés) :	Troubles digestifs (tels qu'hypersalivation et/ou vomissements) Signes neurologiques (ataxie)
---	--

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, soit

à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir également la rubrique « Coordonnées » de la notice.

Posologie

Espèce(s)	Posologie										
	<p>Voie orale.</p> <p>Pour garantir un dosage correct, le poids de l'animal doit être déterminé aussi précisément que possible.</p> <p><u>Posologie :</u></p> <p>La dose recommandée est de 20 mg de pyrantel par kg de poids corporel (soit 57,5 mg d'embonate de pyrantel par kg) et de 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel. Cela équivaut à 1 comprimé pour 4 kg de poids corporel.</p> <p>• Chat</p> <table border="1"><thead><tr><th>Poids corporel</th><th>Comprimé(s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,0 à 2,0 kg</td><td>½</td></tr><tr><td>2,1 à 4,0 kg</td><td>1</td></tr><tr><td>4,1 à 6,0 kg</td><td>1 ½</td></tr><tr><td>6,1 à 8,0 kg</td><td>2</td></tr></tbody></table> <p><u>Administration et durée de traitement :</u></p> <p>Le comprimé peut être administré directement au chat ou mélangé dans de la nourriture.</p> <p>Lors d'infestation par des ascaris, en particulier chez les chatons, l'élimination des parasites peut ne pas être complète, et un risque d'infestation pour l'homme peut persister. Des traitements répétés doivent dans ce cas être effectués avec un produit adapté à un intervalle de 14 jours, et ce jusqu'à 2-3 semaines après le sevrage.</p> <p>En cas de persistance ou d'apparition de signes cliniques, consulter un vétérinaire.</p>	Poids corporel	Comprimé(s)	1,0 à 2,0 kg	½	2,1 à 4,0 kg	1	4,1 à 6,0 kg	1 ½	6,1 à 8,0 kg	2
Poids corporel	Comprimé(s)										
1,0 à 2,0 kg	½										
2,1 à 4,0 kg	1										
4,1 à 6,0 kg	1 ½										
6,1 à 8,0 kg	2										

Temps d'attente

Voie d'administration

- Orale

Conservation et stockage

Température de conservation

Non renseigné

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Conservez la plaquette dans l'emballage extérieur.

Précaution particulière à prendre lors de l'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

Informations commerciales

Présentation	Accessible au groupement	Classement du médicament en matière de délivrance	Numéro d'autorisation de mise sur le marché
FRONTCONTROL WORMER COMPRIMES POUR CHATS, Boîte de 2 comprimés pelliculés sécables	Non	Non soumis à prescription	FR/V/8782834 6/2024

Informations de révision

Date de révision de la notice

01/01/1970 01:00

Responsabilités

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LIMITED

DUBLIN ROAD, LOUGHREA - CO. GALWAY IRLANDE

<https://chanellepharma.com/>

Responsable de la mise sur le marché

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCE

<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>

Responsable de la pharmacovigilance

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCE

<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>