

FRONTLINE SPOT ON CHAT

Identification

Dénomination du médicament vétérinaire

FRONTLINE SPOT ON CHAT

Forme pharmaceutique

Solution pour spot-on

Composition

Principes actifs

- Fipronil
- Butylhydroxyanisole (E320)
- Butylhydroxytoluène (E321)
- Povidone
- Polysorbate 80
- Éthanol anhydre (E1510)
- Ether monoéthylique de diéthylèneglycol

Excipients

Informations supplémentaires

Chaque pipette de 0,5 mL contient :

Substance active :

Fipronil 50,00 mg

Excipient(s) :

Butylhydroxyanisole (E320) 0,10 mg

Butylhydroxytoluène (E321) 0,05 mg

Solution spot-on limpide, incolore à légèrement jaune brunâtre.

Usage clinique

Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
• Chat	Affections à parasites sensibles au fipronil. - Traitement curatif et préventif des infestations par les puces (<i>Ctenocephalides felis</i>) et

Espèce(s)	Utilisation
	<p>par les tiques. - Élimination des poux broyeurs.</p> <p>La durée de protection contre les nouvelles infestations est de 4 semaines pour les puces et de 2 semaines pour les tiques.</p> <p>Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP).</p>

Contre-indications

Précautions et mises en garde

Mise en garde particulière à chaque espèce cible

Des données évaluant l'effet d'un bain ou d'un shampooing sur l'efficacité du médicament vétérinaire chez le chat ne sont pas disponibles. Cependant, sur la base des informations disponibles chez les chiens shampoinés à partir de 2 jours suivant l'application du médicament vétérinaire, il n'est pas recommandé de baigner les animaux dans les deux jours qui suivent l'application du médicament vétérinaire.

Des tiques attachées peuvent occasionnellement être observées. Pour cette raison, la transmission de maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

Les puces des animaux de compagnie infestent souvent leur panier, leur zone de couchage et leurs zones de repos habituelles comme les tapis et les canapés. En cas d'infestation massive et au début de traitement, ces endroits devront être traités, avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles

Éviter le contact avec les yeux de l'animal.

Il est important de veiller à appliquer le médicament vétérinaire sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.

Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament

Ce médicament vétérinaire peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du médicament vétérinaire avec la bouche, la peau et les yeux.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au fipronil ou à l'alcool doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Éviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer à l'eau pure avec soin.

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux

traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Précautions particulières concernant la protection de l'environnement

Sans objet.

Autres précautions

Sans objet.

Interactions et cas particuliers

Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

Gestation et lactation :

Peut être utilisée au cours de la gestation et la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Aucune connue.

Anti-microbiens et anti-parasitaires : lutte contre les résistances

Sans objet.

Effets indésirables et surdosage

Incompatibilité majeure

Aucune connue.

Effets indésirables

Chats :

Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) :	Réaction au site d'application ¹ (desquamation, érythème, prurit, alopecie locale) Prurit généralisé, alopecie Hypersalivation ² , vomissement Symptôme neurologique ³ (hyperesthésie, abattement, autres symptômes nerveux)
--	--

¹ Transitoire.

² Brève en cas de léchage et due à la nature de l'excipient.

³ Réversible.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local, soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir la notice pour les coordonnées respectives.

Posologie

Espèce(s)	Posologie
• Chat	<p>Application spot-on.</p> <p>0,5 mL de solution par animal en application sur la peau.</p> <p>Vider complètement la pipette, directement sur la peau, en écartant les poils de l'animal, de préférence en deux points, à la base du cou et entre les deux épaules, pour éviter le léchage.</p> <p>En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.</p>

Temps d'attente

Voie d'administration

- Spot-on

Conservation et stockage

Température de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

À conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver les pipettes dans l'emballage extérieur de façon à les protéger de l'humidité.

Précaution particulière à prendre lors de l'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car le fipronil pourrait mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger. Ne pas jeter le médicament vétérinaire ou les emballages vides dans les étangs, les rivières ou les ruisseaux.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

Informations commerciales

Présentation	Accessible au groupement	Classement du médicament en matière de délivrance	Numéro d'autorisation de mise sur le marché
FRONTLINE Spot-on Chat Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 mL	Non	Non soumis à prescription	FR/V/8481982 4/1996
FRONTLINE Spot-on Chat Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 mL	Non	Non soumis à prescription	FR/V/8481982 4/1996
FRONTLINE Spot-on Chat Boîte de 1 plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,5 mL	Non	Non soumis à prescription	FR/V/8481982 4/1996
FRONTLINE Spot-on Chat Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,5 mL	Non	Non soumis à prescription	FR/V/8481982 4/1996

Informations de révision

Date de révision de la notice

01/01/1970 01:00

Responsabilités

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
FRANCE

<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>

Responsable de la mise sur le marché

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
FRANCE

<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>

Responsable de la pharmacovigilance

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCE

<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>