

# STRANTEL® 230/20 MG COMPRIMES PELLICULES AROMATISES POUR CHATS

## Identification

### Dénomination du médicament vétérinaire

STRANTEL® 230/20 MG COMPRIMES PELLICULES AROMATISES POUR CHATS

### Forme pharmaceutique

Comprimé

## Composition

### Principes actifs

- Pyrantel (sous forme d'embonate)
- Praziquantel

### Excipients

### Informations supplémentaires

Comprimé pelliculé.

Comprimé blanc à blanc cassé, biconvexe, avec une barre de séabilité sur une face et plat sur l'autre face.

Le comprimé peut être divisé en deux parties égales.

## Usage clinique

### Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
• Chat	- Traitement des infestations mixtes par les nématodes et cestodes gastro-intestinaux : <u>Nématodes</u> : <i>Toxocara cati, Toxascaris leonina</i> <u>Cestodes</u> : <i>Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.</i>

### Contre-indications

## Précautions et mises en garde

### Mise en garde particulière à chaque espèce cible

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour un type commun de ténia (*Dipylidium caninum*).

Une infestation par un ténia réapparaîtra certainement si un contrôle des hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc. n'est pas entrepris.

En cas de risque de ré-infestation, l'avis d'un vétérinaire doit être demandé en ce qui concerne la nécessité et la fréquence d'administration répétée chez le chat. La situation épidémiologique

locale et les conditions de vie des chats doivent être prises en considération. Il est également important de supprimer les sources possibles de ré-infestation telles que les puces et les souris.

## **Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles**

Les comprimés étant aromatisés, ils doivent être conservés dans un endroit sûr hors de portée des animaux.

Les animaux en mauvaise condition ou fortement parasités, et qui peuvent manifester des symptômes tels que diarrhée, vomissements, présence de parasites dans les fèces ou les vomissements, mauvais état du pelage, doivent être examinés par un vétérinaire avant administration du médicament vétérinaire.

Chez les chats sévèrement affaiblis ou fortement infestés, l'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

## **Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament**

Par mesure d'hygiène, les personnes administrant les comprimés directement au chat ou les ajoutant à sa nourriture, doivent se laver les mains après l'administration.

En cas d'ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

## **Précautions particulières concernant la protection de l'environnement**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

## **Autres précautions**

L'échinococcose représente un danger pour l'humain. L'échinococcose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Des directives spécifiques sur le traitement et le suivi, ainsi que la protection des personnes, doivent être obtenues auprès de l'autorité compétente concernée.

## **Interactions et cas particuliers**

### **Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte**

Ne pas utiliser pendant la gestation.

Peut être utilisé pendant la lactation.

### **Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la famille de la pipérazine.

## **Effets indésirables et surdosage**

### **Incompatibilité majeure**

Sans objet.

## Effets indésirables

Chats :

Très rare ( < 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) :	Troubles gastro-intestinaux (par exemple des vomissements et/ou une hypersalivation) Signes neurologiques (par exemple une ataxie et des tremblements musculaires)
---	---

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local, soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir la rubrique « coordonnées » de la notice

## Posologie

Espèce(s)	Posologie										
• Chat	<p>Voie orale.</p> <p>Afin de garantir une posologie appropriée, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.</p> <p><b>Posologie :</b></p> <p>La dose recommandée est de 20 mg de pyrantel par kg de poids corporel (soit 57,5 mg d'embonate de pyrantel par kg de poids corporel) et de 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel <u>en une seule administration</u>. Cela équivaut à 1 comprimé pour 4 kg de poids corporel.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Poids corporel (kg)</th><th>Comprimé(s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,0 à 2,0 kg</td><td>½</td></tr><tr><td>2,1 à 4,0 kg</td><td>1</td></tr><tr><td>4,1 à 6,0 kg</td><td>1 ½</td></tr><tr><td>6,1 à 8,0 kg</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Poids corporel (kg)	Comprimé(s)	1,0 à 2,0 kg	½	2,1 à 4,0 kg	1	4,1 à 6,0 kg	1 ½	6,1 à 8,0 kg	2
Poids corporel (kg)	Comprimé(s)										
1,0 à 2,0 kg	½										
2,1 à 4,0 kg	1										
4,1 à 6,0 kg	1 ½										
6,1 à 8,0 kg	2										

### Administration et durée de traitement :

Le comprimé peut être administré directement au chat ou, si nécessaire, dissimulé dans la nourriture.

Espèce(s)	Posologie
	<p>Lors d'infestation par les ascaris, en particulier chez les chatons, l'élimination des parasites peut ne pas être complète, et un risque d'infestation pour l'homme peut persister. Des traitements répétés doivent dans ce cas être effectués avec un produit adapté à un intervalle de 14 jours, et ce jusqu'à 2-3 semaines après le sevrage.</p> <p>En cas de persistance ou d'apparition de signes cliniques, consulter un vétérinaire.</p>

## Temps d'attente

### Voie d'administration

- Orale

## Conservation et stockage

### Température de conservation

Non renseigné

### Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de précaution particulière de conservation.

### Précaution particulière à prendre lors de l'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

## Informations commerciales

Présentation	Accessible au groupement	Classement du médicament en matière de délivrance	Numéro d'autorisation de mise sur le marché
STRANTEL® CHATS Boîte de 2 comprimés pelliculés sécables	Oui	Non soumis à prescription	FR/V/6204539 3/2014
STRANTEL® CHATS Boîte de 4 comprimés pelliculés sécables	Oui	Non soumis à prescription	FR/V/6204539 3/2014

## Informations de révision

### Date de révision de la notice

01/01/1970 01:00

## Responsabilités

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LIMITED**

*DUBLIN ROAD, LOUGHREA - CO. GALWAY IRLANDE*

<https://chanellepharma.com/>

**Responsable de la mise sur le marché**

**LABORATOIRE PERRIGO FRANCE**

*(Gamme Clément -Thékan)*

*20, rue André Gide*

*B.P. 80*

*92321 CHATILLON CEDEX*

<https://www.clement-thekan.fr/>

**Responsable de la pharmacovigilance**

**LABORATOIRE PERRIGO FRANCE**

*(Gamme Clément -Thékan)*

*20, rue André Gide*

*B.P. 80*

*92321 CHATILLON CEDEX*

<https://www.clement-thekan.fr/>