

# SERESTO Collier Médicamenteux grands chiens

## Identification

### Dénomination du médicament vétérinaire

SERESTO Collier Médicamenteux grands chiens

### Forme pharmaceutique

Collier

## Composition

### Principes actifs

- Imidaclopride
- Fluméthrine
- Dioxyde de titane (E 171)
- Oxyde de fer noir (E 172)
- Adipate de dibutyle
- Dicaprylocaprate de propylèneglycol
- Huile de soja époxydée
- Acide stéarique
- Chlorure de polyvinyle

### Excipients

### Informations supplémentaires

Gris, sans odeur et porte le nom du médicament vétérinaire sur une face.

Chiens de plus de 8 kg

## Usage clinique

### Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
• Chien	<p>Chez les chiens de plus de 8 kg :</p> <p>Chiens infestés ou à risque d'infestations mixtes par des puces, des tiques, des poux et des phlébotomes.</p> <p>Le médicament vétérinaire n'est indiqué que lorsqu'il est nécessaire de l'utiliser simultanément contre toutes les espèces de parasites cibles.</p> <p>Traitements des infestations et prévention des réinfestations par les puces (<i>Ctenocephalides canis</i>, <i>Ctenocephalides felis</i>) grâce à son activité insecticide pendant 7 à 8 mois.</p> <p>Le médicament vétérinaire protège l'environnement immédiat de l'animal contre le développement de larves de puces pendant 8 mois. Le médicament vétérinaire peut</p>

Espèce(s)	Utilisation
	<p>être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP) lorsqu'elle a été préalablement diagnostiquée par un vétérinaire.</p> <p>Prévention des réinfestations par les tiques (<i>Ixodes ricinus</i>, <i>Rhipicephalus sanguineus</i>), par effet acaricide (letal) et répulsif (anti-gorgement) dans les 2 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois.</p> <p>Prévention des réinfestations par les tiques (<i>Dermacentor reticulatus</i>) par effet acaricide (letal) dans les 2 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois.</p> <p>Il est efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes.</p> <p>Réduction du risque de transmission des parasites <i>Babesia canis vogeli</i> et <i>Ehrlichia canis</i> réduisant ainsi le risque de babésiose canine et d'ehrlichiose canine pendant 7 mois grâce aux effets acaricides et répulsifs sur la tique vectrice <i>Rhipicephalus sanguineus</i>.</p> <p>L'effet est indirect via l'activité du médicament vétérinaire contre le vecteur.</p> <p>Réduction du risque de transmission du parasite <i>Leishmania infantum</i> jusqu'à 8 mois, réduisant ainsi le risque de leishmaniose canine, grâce à l'activité répulsive contre les phlébotomes.</p> <p>L'effet est indirect via l'activité du médicament vétérinaire contre les vecteurs.</p> <p>Traitement des infestations par les poux broyeurs (<i>Trichodectes canis</i>).</p>

## Contre-indications

## Précautions et mises en garde

### Mise en garde particulière à chaque espèce cible

Les tiques déjà présentes sur le chien avant le traitement peuvent ne pas être tuées dans les 48 heures après l'application du collier, et rester fixées et visibles. Par conséquent, il est recommandé d'enlever les tiques déjà présentes sur le chien au moment de l'application. La prévention contre les infestations par de nouvelles tiques commence dans les deux jours après l'application du collier.

Les tiques seront tuées et se détacheront de l'hôte 24 à 48 heures après l'infestation, en règle générale sans avoir pris de repas sanguin. La fixation d'une tique après le traitement reste possible. Par conséquent, la transmission de maladies infectieuses par des tiques ne peut être totalement exclue si les conditions sont défavorables.

Bien qu'une diminution significative de l'incidence de *Leishmania infantum* chez le chien ait été démontrée, le médicament vétérinaire a montré une efficacité répulsive (anti-gorgement) variable ainsi qu'une efficacité insecticide variable contre *Phlebotomus perniciosus*. Ainsi, des piqûres de phlébotomes peuvent survenir et la transmission de *Leishmania infantum* ne peut pas être complètement exclue. Le collier doit être posé juste avant le début de la période d'activité des phlébotomes, correspondant à la saison de transmission de *Leishmania infantum*. Le collier doit être porté en continu pendant toute la saison à risque.

Idéalement, le collier devrait être appliqué avant le début de la saison des puces et tiques.

Comme pour tous les médicaments vétérinaires à action topique de longue durée, les périodes saisonnières de forte chute de poils peuvent éventuellement provoquer une légère réduction transitoire de l'efficacité du traitement due à la perte d'une partie des substances actives fixée aux poils. Le relargage des actifs à partir du collier reprend immédiatement, de sorte qu'une pleine efficacité sera rétablie sans traitement supplémentaire ni remplacement du collier.

La possibilité que d'autres animaux du même foyer puissent être une source de ré-infestation par des puces, des poux broyeurs et des tiques doit être envisagée et ces animaux doivent être traités si nécessaire avec un médicament vétérinaire approprié.

Pour un contrôle optimal des puces dans les habitations fortement infestées, il peut être nécessaire de traiter l'environnement avec un insecticide adapté.

Les puces peuvent infester les lits, les zones de couchage et les zones de repos habituelles des animaux de compagnie, comme les tapis et les canapés. En cas d'infestation massive, ces endroits devront être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

En l'absence de risque de co-infestation par les puces, les tiques et les poux broyeurs, un médicament vétérinaire à spectre étroit doit être utilisé.

L'utilisation inutile des antiparasitaires ou une utilisation dérogeant aux instructions données dans le RCP peut augmenter la pression de sélection de résistance et entraîner une réduction

de l'efficacité.

La décision d'utiliser le médicament vétérinaire devrait être basée sur la confirmation de l'espèce et de la charge parasitaire, ou du risque d'infestation en fonction de ses caractéristiques épidémiologiques, pour chaque animal individuellement.

En Europe, une résistance aux pyréthroïdes a été signalée dans un cas isolé de *Rhipicephalus sanguineus* chez le chien. Aucune résistance des puces à l'imidaclopride n'a été signalée à ce jour.

Le médicament vétérinaire est résistant à l'eau ; il reste efficace si l'animal est mouillé. Toutefois, il convient d'éviter une exposition prolongée et intense à l'eau ou un shampouinage intensif car la durée d'activité du médicament vétérinaire pourrait s'en trouver réduite. Des études démontrent qu'une immersion dans de l'eau ou un shampooing mensuel ne raccourcit pas de manière significative la durée d'efficacité de 8 mois contre les tiques après relargage des substances actives sur le pelage, tandis que l'efficacité du médicament vétérinaire contre les puces diminue progressivement à partir du 5<sup>ème</sup> mois. Les effets d'un shampooing ou de l'immersion dans l'eau sur la transmission de la leishmaniose canine n'ont pas été étudiés.

### **Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles**

Sans objet.

### **Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament**

Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu'à son utilisation. Comme pour tout médicament vétérinaire, ne pas autoriser les jeunes enfants à jouer avec le collier ni à le mettre dans leur bouche. Les animaux portant le collier ne doivent pas être autorisés à dormir dans le même lit que leurs propriétaires, surtout les enfants. L'imidaclopride et la fluméthrine sont libérés de manière continue du collier vers la peau et le pelage pendant que le collier est porté.

Le médicament vétérinaire peut causer des réactions d'hypersensibilité chez certaines personnes.

Les personnes ayant une hypersensibilité (allergie) aux ingrédients du collier devront éviter tout contact direct avec celui-ci.

Dans des très rares cas, le médicament vétérinaire peut produire une irritation de la peau, des yeux ou des voies respiratoires. En cas d'irritation des yeux, laver les yeux avec de l'eau froide. En cas d'irritation de la peau, laver la peau avec du savon et de l'eau froide. Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui montrer cette notice.

Eliminer immédiatement tous restes ou chutes du collier (voir rubrique « **Posologie** »).

Se laver les mains à l'eau froide après la mise en place du collier.

### **Précautions particulières concernant la protection de l'environnement**

Voir rubrique : Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments.

## Autres précautions

Aucune.

## Interactions et cas particuliers

### Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie chez les espèces cibles pendant la gestation et la lactation.

#### Gestation et lactation :

L'utilisation est déconseillée pendant la gestation et la lactation.

Des études de laboratoire menées avec la fluméthrine ou l'imidaclopride sur des rats et des lapins n'ont révélé aucun effet tératogène ou fœtotoxique.

#### Fertilité :

Les études de laboratoire menées avec la fluméthrine ou l'imidaclopride sur des rats et des lapins n'ont révélé aucun effet sur la fertilité ou la reproduction.

### Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Non connue.

## Effets indésirables et surdosage

### Incompatibilité majeure

Aucune connue.

### Effets indésirables

Chien

Rare (1 à 10 animaux / 10 000 animaux traités) :	Réaction au site d'application <sup>1</sup> (telle que, érythème, perte de poils, prurit, grattage)  Troubles du comportement <sup>2</sup> (tels que, mastication, léchage et toilettage excessifs <sup>3</sup> , tendance à se cacher, hyperactivité, vocalisation)  Diarrhée <sup>4</sup> , hypersalivation <sup>4</sup> , vomissements <sup>4</sup>  Changement de prise alimentaire <sup>4</sup> ,
---	--

	Dépression <sup>4</sup>  Symptômes neurologiques <sup>5</sup> (tels que, ataxie, convulsions, tremblements)
Très rare  (<1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) :	Réaction au site d'application <sup>5</sup> (telles que, dermatite, eczéma, hémorragie, inflammation, lésion)  Agressivité <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Les signes disparaissent généralement en 1 à 2 semaines. Dans certains cas, il est recommandé d'enlever temporairement le collier jusqu'à ce que les signes disparaissent.

<sup>2</sup> Peut être observé chez les animaux qui ne sont pas habitués à porter des colliers dans les premiers jours suivant la pose.

<sup>3</sup> Sur le site d'application.

<sup>4</sup> Réactions légères et transitoires pouvant survenir lors de la première utilisation.


<sup>5</sup> Dans ces cas, il est recommandé de retirer le collier.

<sup>6</sup> S'assurer de la bonne mise en place du collier.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire soit au titulaire d'AMM ou son représentant local soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir également la notice pour les coordonnées respectives.

## Posologie

Espèce(s)	Posologie
• Chien	Usage cutané. Un collier par animal, à fixer autour du cou.  Les chiens de plus de 8 kilos reçoivent un collier de 70 cm de long.  Un sous-dosage pourrait entraîner une utilisation inefficace et favoriser le développement d'une résistance. Pour garantir un dosage correct, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.  Application externe uniquement.   Retirer le collier du sachet protecteur immédiatement avant son utilisation. Dérouler le collier et vérifier que l'intérieur du collier est exempt de restes de languettes de fixation en plastique. Passer le collier dans la boucle et l'ajuster autour du cou de l'animal sans le serrer de manière excessive (il est conseillé de laisser un espace de 2 doigts entre le

Espèce(s)	Posologie
	<p>collier et le cou). Faire passer le reste du collier dans la boucle et couper toute longueur superflue au-delà de 2 cm.</p>  <p>Le collier doit être porté sans interruption durant la période de protection de 8 mois et enlevé à l'issue de cette période. Vérifier périodiquement l'ajustement du collier en le réglant si nécessaire, notamment dans le cas de chiots qui grandissent rapidement.</p>

## Temps d'attente

### Voie d'administration

- Cutanée

## Conservation et stockage

### Température de conservation

Non renseigné

### Précautions particulières de conservation selon pertinence

Non renseigné

### Précaution particulière à prendre lors de l'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car l'imidaclopride et la fluméthrine pourraient mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

## Informations commerciales

<b>Présentation</b>	<b>Accessible au groupement</b>	<b>Classement du médicament en matière de délivrance</b>	<b>Numéro d'autorisation de mise sur le marché</b>
SERESTO Collier grands chiens Boîte de 2 sachets de 1 collier de 70 cm	Non	Non soumis à prescription	FR/V/7403801 3/2011
SERESTO Collier grands chiens Boîte de 12 sachets de 1 collier de 70 cm	Non	Non soumis à prescription	FR/V/7403801 3/2011
SERESTO Collier grands chiens Boîte de 1 sachet de 1 collier de 70 cm	Non	Non soumis à prescription	FR/V/7403801 3/2011

## Informations de révision

### Date de révision de la notice

01/01/1970 01:00

## Responsabilités

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

#### **ELANCO**

*Heinz-Lohmann-Strasse 4  
27472 Cuxhaven  
Allemagne*

### Responsable de la mise sur le marché

#### **ELANCO FRANCE**

*Crisco Uno, Bâtiment C  
3-5 avenue de la Cristallerie  
92310 Sèvres - France*

<http://www.elanco.fr>

### Responsable de la pharmacovigilance

#### **ELANCO FRANCE**

*Crisco Uno, Bâtiment C  
3-5 avenue de la Cristallerie  
92310 Sèvres - France*

<http://www.elanco.fr>