

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si l'un des effets indésirables devient grave, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ?
3. Comment utiliser OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce collyre est indiqué en cas de maladies de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ?

Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

**N'utilisez jamais OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose :**

NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédent d'allergie à l'un des composants du collyre.

**Faites attention avec OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose :**

#### Précautions d'emploi

- NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
- NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.
- Ne pas dépasser la posologie recommandée.
- En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Grossesse et allaitement

D'UNE FAÇON GENERALE, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, IL CONVIENT DE DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre. Dans ce cas, attendre la fin des symptômes pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.

### 3. COMMENT UTILISER OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ?

#### Posologie

Adultes et enfants : selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour à intervalles réguliers.

Chez l'enfant, un avis médical est nécessaire.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

#### Mode d'administration

Voie ophtalmique.

Chaque unidose contient une quantité suffisante de collyre pour traiter les deux yeux.

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation
- Éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.
- Instiller une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Jeter l'unidose immédiatement après utilisation. Ne la conserver pas pour une utilisation ultérieure.

Si vous avez l'impression que l'effet d'OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous avez utilisé plus d'OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre, mais poursuivez simplement votre traitement.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de survenue :

- de réaction allergique aux composants du produit
- de gêne visuelle passagère après instillation du collyre.

**Déclaration des effets secondaires :** Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Jeter le récipient unidose après utilisation.

Ne pas réutiliser un récipient unidose déjà entamé.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose?**

**La substance active est :**

Cromoglicatate de sodium.....2 g  
pour 100 ml de collyre

**L'autre composant est :**

Eau purifiée.

**Qu'est ce que OPHTACALM 2%, collyre en solution en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme d'un collyre en solution en récipient unidose : boîte de 10 récipients unidoses de 0,35 ml.

**Titulaire et Exploitant**

**LABORATOIRE CHAUVIN**

416 RUE SAMUEL MORSE

34000 MONTPELLIER - FRANCE

**Fabricant**

**LABORATOIRE CHAUVIN**

ZI RIPOTIER HAUT

07200 AUBENAS - FRANCE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est novembre 2013.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

®/TM signifie que ce sont des noms de marque appartenant à Bausch&Lomb Incorporated ou à l'une de ses filiales.

© Bausch&Lomb Incorporated.

**BAUSCH + LOMB**

Laboratoire CHAUVIN

416 rue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER - FRANCE

Information médicale /Medical information: +33 (0)4 67 12 30 30