

Permixon 160 mg

Extrait lipido-stérolique de *Serenoa repens*

GÉLULES

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS L'HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule

Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées. L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable. NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament à jeun peut parfois être la cause de nausées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Posologie : 2 gélules par jour. SE CONFORMER À L'AVIS MÉDICAL.

Mode d'administration : Voie orale. Il est conseillé de prendre les gélules avec un verre d'eau au moment des repas. SE CONFORMER À L'AVIS MÉDICAL.

Fréquence d'administration : SE CONFORMER À L'AVIS MÉDICAL.

Durée de traitement : SE CONFORMER À L'AVIS MÉDICAL.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PERMIXON 160 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées et des douleurs abdominales, de rares éruptions cutanées et œdèmes et exceptionnellement des gynécomasties réversibles à l'arrêt du traitement. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser PERMIXON 160 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte. Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 30 °C. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient PERMIXON 160 mg, gélule ?

La substance active est :

Extrait lipido-stéroïdique de *Serenoa repens* (ELSSR)* 160 mg

Pour une gélule

*Constitué par les acides gras (97 %) libres et/ou estérifiés et par une fraction d'insaponifiables (3 %).

Les autres composants sont :

Polyéthylène glycol 10 000.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, oxyde de fer jaune, indigotine, dioxyde de titane.

Qu'est-ce que PERMIXON 160 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 60 ou 180.

Titulaire / Exploitant : PIERRE FABRE MÉDICAMENT

45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

Fabricant : PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 04 septembre 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Information médicale : 0 800 950 564.



Pierre Fabre



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.