Colludol

Hexamidine - Lidocaïne

MAUX DE GORGE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION : COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

DIISETHIONATE D'HEXAMIDINE ..... 0,100 g
CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE ..... 0,200 g

Glycérol, saccharose, arôme fruit de la passion (contient du propylèneglycol), arôme pêche (contient du propylèneglycol), arôme menthe (contient de l'alcool), eau purifiée pour 100 ml de solution
Gaz de pressurisation : azote.
Pression : 7 bars.

FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale - Flacon de 30 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :
ANTISEPTIQUE LOCAL / ANESTHESIQUE LOCAL. (R : système respiratoire)

TITULAIRE / EXPLOITANT :
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE - Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX

FABRICANT :
SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE (SPPH)
7, Impasse des Boussenots - 21800 QUETIGNY-LES-DIJON

DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament contient un antiseptique local et un anesthésique local. Il est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MEDICAMENT :
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux et à l'hexamidine.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT LA PRISE DU MEDICAMENT :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

MISES EN GARDE SPECIALES :
- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :
- de n'utiliser ce médicament que sur avis médical chez l'enfant de 6 à 12 ans.
- de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.
- Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux, avec possibilité de convulsions, et sur le cœur.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou un déficit en sucrase / isomaltase (maladies héréditaires rares).
- Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, introduite dans le nez ou dans les oreilles.
- Mal de gorge : En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

- Aphtes, petites plaies de la bouche : En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre : Consultez immédiatement votre médecin. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :
Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :
D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

SPORTIFS :
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

LISTE DES EXCIPIENTS AYANT UN EFFET NOTOIRE :
Saccharose, propylène glycol, alcool.

COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT :

POSOLOGIE :
Adulte :
- 1 à 2 pulvérisations 3 fois par jour.
- Ne pas dépasser la dose de 2 pulvérisations par prise et 3 prises par jour.

Enfant de 6 à 15 ans :
- 1 pulvérisation 1 à 3 fois par jour.
- Ne pas dépasser la dose de 1 pulvérisation par prise et 3 prises par jour.

Ce médicament vous a été personnellement délivré ou prescrit dans une situation précise :
. Il ne peut pas être adapté à un autre cas.
. Ne pas le conseiller à une autre personne.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Pulvérisation buccale.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE
Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

DUREE DU TRAITEMENT :
Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :
- survenue de rougeur, de gonflement du visage et de la gorge : dans ce cas arrêter immédiatement le traitement et consulter votre médecin,
- engourdissement passager de la langue,
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers »), il est conseillé d'interrompre le traitement et demander avis à un médecin.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionnné dans cette notice.

CONSERVATION : NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Récipient sous pression :
- ne pas l'exposer à une température supérieure à 50°C, ni au soleil,
- ne pas percer,
- ne pas jeter au feu même vide.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Date de révision de la notice : septembre 2005.

ANA90COO01B

COOPER Place Lucien Auvert - 77020 Melun cedex