



86110.12 (07.11)

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Ce médicament peut être utilisé en automédication, c'est-à-dire sans consultation ni prescription d'un médecin.
  - Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
  - Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**

## comprimé à sucer

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que HEXALYSE, comprimé à sucer et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HEXALYSE, comprimé à sucer ?
3. Comment prendre HEXALYSE, comprimé à sucer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HEXALYSE, comprimé à sucer ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE HEXALYSE, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE et ANTISEPTIQUE (R : système respiratoire)  
Ce médicament est préconisé dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HEXALYSE, comprimé à sucer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- antécédents d'allergie au biclotymol ou à l'un des composants du comprimé.

#### Précautions d'emploi

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) : **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée au-delà de 5 jours sans avis médical.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption

du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 1,054 g de saccharose par comprimé dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110, jaune orangé) et peut provoquer des réactions allergiques.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

L'utilisation simultanée ou successive d'antiseptiques locaux est à éviter compte-tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation).

Ce médicament contient du bicitymol, du chlorhydrate de lysozyme et de l'énoxolone.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration).

#### **Grossesse et allaitement**

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Liste des excipients à effet notoire :  
Jaune orangé S (E110), saccharose.

#### **3. COMMENT PRENDRE HEXALYSE, comprimé à sucer ?**

##### **Mode d'administration**

Sucer lentement les comprimés, sans les croquer. Voie orale.

##### **Fréquence d'administration**

6 à 8 comprimés à sucer par 24 heures, en répartissant les prises.

##### **Durée du traitement**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée au-delà de 5 jours sans avis médical.

Si vous avez pris plus d'HEXALYSE, comprimé à sucer que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre HEXALYSE, comprimé à sucer :

Ne prenez pas double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, HEXALYSE, comprimé à sucer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de réactions allergiques cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER HEXALYSE, comprimé à sucer ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Que contient HEXALYSE, comprimé à sucer ?

**Les substances actives sont :**

Bicitymol.....5,0 mg

Chlorhydrate de lysozyme.....5,0 mg

Enoxolone.....5,0 mg

Pour un comprimé à sucer de 1200,0 mg.

**Les autres composants sont :**

Huile essentielle de citron, acide citrique monohydraté, jaune orangé S (E110), stéarate de magnésium, gomme arabique, sucre glace.

Qu'est-ce que HEXALYSE, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?

Comprimé à sucer en boîte de 24.

**Titulaire/ Exploitant**

BOUCHARA-RECORDATI (Laboratoires)

68, rue Marjolin - 92300 LEVALLOIS-PERRET

**Fabricant**

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Parc Mécatronic - 03410 SAINT-VICTOR

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



Les laboratoires Bouchara-Recordati (LBR) cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. LBR participe, de plus, à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. LBR vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.