



Cuivre
Or
Argent



IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION

Cuivre-Or-Argent OLIGOSOL
Solution buvable en flacon de 60 ml (30 doses)

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

	Pour 100 ml	Pour 2 ml
GLUCONATE DE CUIVRE	22,50 mg	0,45 mg
Soit en cuivre	3,15 mg	63 µg
OR COLLOIDAL	0,07 mg	1,4 µg
GLUCONATE D'ARGENT	3,00 mg	0,06 mg
Soit en argent	1,068 mg	21,36 µg

Excipient : Eau purifiée.

Le godet comprend deux graduations correspondant à 2 ml de solution (1 dose) et à 4 ml de solution (2 doses).

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

OLIGOTHERAPIE (V : divers)

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT

LABCATAL
7, rue Roger Salengro - B.P.305
92541 MONTROUGE Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

LABCATAL - ZI du Mont Blanc
1, rue de l'Industrie - B.P.267
74106 ANNEMASSE Cedex

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours de la phase de convalescence de maladies infectieuses, d'états asthéniques.

ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE-ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

RÉSERVÉ À L'ADULTE

1 dose (contenu de la première graduation du godet 2 ml) à 2 doses (contenu de la deuxième graduation du godet 4 ml) par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Remplir le godet à ras des graduations en pressant légèrement sur le flacon. Revisser le bouchon après chaque utilisation.



Voie orale.

L'administration par voie sublinguale est recommandée.

Les doses sont à prendre :

- de préférence le matin à jeun,
- éventuellement 15 minutes avant un repas.

Garder le contenu du godet doseur 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Septembre 2009.

MÉDICAMENT AUTORISÉ N° 3400930750797

LABCATAL

N1003L1110