

APAI SYLGEL 0,75 %, gel pour application locale

Chlorhydrate d'isothipendyl

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que APAISYLGEL 0,75 % et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser APAISYLGEL 0,75 % ?
3. Comment utiliser APAISYLGEL 0,75 % ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver APAISYLGEL 0,75 % ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE APAISYLGEL 0,75 % ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-HISTAMINIQUE POUR USAGE LOCAL – ANTI-PRURIGINEUX. (D. Dermatologie).

Ce médicament est un antihistaminique pour usage local. Il appartient à la classe des médicaments dermatologiques.

Il est préconisé en cas de démangeaison, en particulier piqûres d'insectes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER APAISYLGEL 0,75 % ?

Contre-indications

N'utilisez jamais APAISYLGEL 0,75 % dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie aux antihistaminiques,
- lésions cutanées infectées ou irritées,
- lésions cutanées suintantes.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec APAISYLGEL 0,75 % :

Mises en garde spéciales

Ne pas appliquer sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée ou chez le prématuré ou chez le nourrisson en raison du risque de passage du principe actif dans le sang. Ne pas appliquer sur les muqueuses. Ce médicament contient de l'acide sorbique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Précautions d'emploi

La démangeaison n'est qu'un symptôme qui peut avoir des causes multiples nécessitant l'avis de votre médecin en particulier en cas de persistance ou d'aggravation des troubles.

APAI SYLGEL 0,75 % n'est pas un protecteur solaire.

APAI SYLGEL 0,75 % ne doit pas être utilisé comme crème de soins sur une peau saine.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

31021744

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants d' APAISYL GEL 0,75 % :

Liste des excipients à effet notoire : Acide sorbique.

3. COMMENT UTILISER APAISYL GEL 0,75 % ?

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 mois.

Posologie

1 application 2 à 3 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Durée du traitement

En cas de persistance des troubles après 5 jours de traitement, consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre APAISYL GEL 0,75 % :

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, APAISYL GEL 0,75 % est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Risque d'allergie à l'isothipendyl ou à un composant du gel.
- Très rares cas de photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER APAISYL GEL 0,75 % ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser APAISYL GEL 0,75 % après la date de péremption mentionnée sur l'emballage extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient APAISYL GEL 0,75 % ?

La substance active est :

Chlorhydrate d'isothipendyl.....0,750 g

Pour 100 g de gel pour application locale..

Les autres composants sont :

Acide édélique, acide sorbique, sorbitol à 70 pour cent non cristallisable, carboxyméthylcellulose sodique, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu'est ce que APAISYL GEL 0,75 % et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel pour application locale. Tube de 30 g.

Titulaire : MERCK MÉDICATION FAMILIALE SAS – 37, rue Saint-Romain – 69379 Lyon Cedex 08

Exploitant : MERCK MÉDICATION FAMILIALE – 18 C, boulevard Winston Churchill – 21000 DIJON

Fabricant : FAMAR LYON – 29, Avenue Charles de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19 Juillet 2010. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l' Afssaps (France) - www.afssaps.fr



En France métropolitaine, Merck Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Merck Médication Familiale vous demande, en conséquence, de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



L1011211