

microlax®

bébé

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

MICROLAX® BÉBÉ, solution rectale en récipient unidose.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Pour un récipient unidose de 3,87 g :

Sorbitol à 70 % cristallisable : 2,6790 g

Citrate de sodium : 0,2700 g

Laurylsulfoacétate de sodium à 70 % : 0,0387 g

Excipients : Acide sorbique, glycérol, eau purifiée

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution rectale en récipient unidose (boîte de 4).

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

LAVEMENT

(A : appareil digestif et métabolisme)

Titulaire / Exploitant :

Johnson & Johnson Santé Beauté France

1 rue Camille Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Famar Orléans

5, Avenue de Concyr

45071 Orléans Cedex 2

FRANCE

2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé comme traitement symptomatique de certaines formes de constipation et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

3. ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement de mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre nécessite l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autre :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...);
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits;
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...);
- une rééducation du réflexe de défécation;
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisez ce médicament *AVEC PRECAUTION* en cas de :

- poussée hémorroïdaire,
- fissure anale,
- rectocolite hémorragique.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT


POSOLOGIE

- Traitement de la constipation : 1 récipient unidose par jour.
- Préparation aux examens endoscopiques du rectum : 1 récipient unidose administré 5 à 20 minutes avant l'heure choisie pour la selle.


MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Ce médicament s'administre par voie rectale.


Mode d'emploi :




1. Après avoir cassé l'embout, appuyer légèrement sur le tube pour en faire apparaître une goutte.




2. Lubrifier la canule avec cette goutte.



3. Introduire la canule dans le rectum.



4. Vider par pression tout le contenu du tube.



5. Retirer la canule sans relâcher la pression sur le tube.

Il n'est pas nécessaire d'être allongé pour administrer le produit ni pour attendre qu'il produise son effet. Ce médicament agit le plus souvent en 5 à 20 minutes ; un délai plus important (supérieur à 1 heure) peut s'observer chez les sujets alités.

DUREE DU TRAITEMENT

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Un usage prolongé peut donner lieu à des sensations de brûlures anales et exceptionnellement des inflammations du rectum.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Février 2011.



Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages de médicaments vendus en officine. Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte

et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.



F308564