

**Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.**

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?
3. Comment prendre RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?
6. Informations supplémentaires.

80744271/011FR

**1. QU'EST-CE QUE RENNIE SANS SUCRE, COMPRIMÉ À CROQUER ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**  
**ANTIACIDES.**

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et les remontées acides.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RENNIE SANS SUCRE, COMPRIMÉ À CROQUER ?**  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.**Ne prenez jamais RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer en cas :**

- D'antécédents d'allergie à l'un des composants du comprimé,
- De maladie grave du rein,
- D'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Mises en garde spéciales**

Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :

- Si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- Si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- Si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- Si vous souffrez d'une maladie des reins.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).  
**NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**

**Précautions d'emploi**

- Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
- Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes. Vous ne devez pas dépasser 12 comprimés par jour.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Prise d'autres médicaments**

Ce médicament contient **des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium)**. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse et allaitement**

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

**Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

**Allaitement**

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

**Liste des excipients à effet notoire:** sorbitol.

**3. COMMENT PRENDRE RENNIE SANS SUCRE, COMPRIMÉ À CROQUER ?****Posologie**

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans)

- 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés par jour.
- En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à 12 comprimés par jour.
- La durée du traitement sera limitée à 10 jours.

#### Mode d'administration

Voie orale.  
Sucez ou croquez le ou les comprimés.

#### Fréquence d'administration

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

#### Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 10 jours.

#### **Si vous avez pris plus de RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer que vous n'auriez dû :**

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de troubles digestifs tels que diarrhées,
- A doses fortes et prolongées, survenues possibles d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), de calculs rénaux et de troubles rénaux graves,
- En raison de la présence de sorbitol, possibilité de troubles digestifs et de diarrhées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER RENNIE SANS SUCRE, COMPRIMÉ À CROQUER ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

##### **Que contient RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?**

##### **Les substances actives sont :**

Carbonate de calcium .....680,0 mg

Carbonate de magnésium lourd .....80,0 mg

Pour un comprimé à croquer.

##### **Les autres composants sont :**

Sorbitol, amidon de pomme de terre, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide légère, arôme menthe\*, saccharine sodique.

\* composition de l'arôme menthe : mélange d'huiles essentielles de *Mentha spicata L.* et de *Mentha piperita*

##### **Qu'est ce que RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimés à croquer. Boîte de 12, 36 et 60.

##### **Titulaire / Exploitant / Fabricant**

**BAYER SANTE FAMILIALE**

33, rue de l'Industrie

74240 Gaillard - France

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 3 mai 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

#### **CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE**

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac. Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

- Évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,
- Évitez les repas abondants et riches en graisses,
- Évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- Mangez lentement,
- Variez votre alimentation,
- Normalisez votre poids,
- Évitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

**Bayer**

**VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS. N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS. NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**



Bayer Santé Familiale cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Bayer Santé Familiale participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuses de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Bayer Santé Familiale vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.