

• Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt

Les substances actives sont :

- Gluconate de chlorhexidine 3 mg
- Chlorhydrate de tétracéine 0,2 mg

Les autres composants sont : acide ascorbique, arôme coquelicot (alcoolat de cerise ; alcoolat de framboise ; alcoolatures de cerise, de framboise, de bourgeons de cassis, de cassis, de vanille), arôme pulmoral (menthol ; huile essentielle d'eucalyptus ; thymol ; terpinéol), glycyrrhizinate d'ammonium, lubrifiant (amidon de maïs, huile de palme pure raffinée et désodorisée ; huile de tournesol ; monoglycérides préparées à partir de matières grasses alimentaires raffinées et hydrogénées ; lécithine de soja normalisée ; butylhydroxytoluène ; butylhydroxyanisole), aspartam, isomalt. Pour une pastille de 2,5 g.

• Que sont

Drill, pastille à sucer

Drill citron menthe, pastille à sucer

Drill miel rosat, pastille à sucer

Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt

Et dans quel cas ces médicaments sont-ils utilisés ?

Ces médicaments contiennent une association de deux principes actifs

- un antiseptique local, la chlorhexidine,

- un anesthésique local, la tétracéine,

ANTISEPTIQUE LOCAL, ANESTHESIQUE LOCAL (R : système respiratoire)

Ils sont préconisés en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

• Informations nécessaires avant utilisation

Ces médicaments ne doivent pas être utilisés en cas d'allergie connue aux anesthésiques locaux et à la chlorhexidine ou aux autres composants et chez l'enfant de moins de 6 ans.

Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt, ne doit pas être utilisé en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

Prendre des précautions particulières avec ces médicaments :

L'anesthésie provoquée par ces médicaments au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

- De n'utiliser ces médicaments qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans.
- De ne pas utiliser ces médicaments avant les repas ou avant la prise de boisson.
- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ces médicaments n'est pas souhaitable car ils peuvent modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.
- Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ces médicaments en passant dans la circulation sanguine, sont susceptibles de retentir sur le système nerveux avec possibilités de convulsions et sur le cœur.

- L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que ces spécialités contiennent un principe actif (la tétracéine) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

NE LAISSER NI À LA PORTÉE, NI À LA VUE DES ENFANTS.

• Précautions d'emplois

Drill, pastille à sucer.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte de l'apport de 2,5 g environ de sucre par pastille.

Drill citron menthe, pastille à sucer.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte de l'apport de 2,5 g environ de sucre par pastille.

Drill miel rosat, pastille à sucer.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte de l'apport de 2,5 g environ de sucre par pastille.

Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt.

L'apport calorique est de 8 Kcal par pastille.

Mal de gorge : En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : **consultez votre médecin.**

Aphtes, petites plaies de la bouche : En cas de lésions étendues, d'extension des lésions, d'apparition de fièvre : **consultez immédiatement votre médecin.** En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• **Grossesse et allaitement** : Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Liste des excipients à effet notoire :

Drill, pastille à sucer,

Saccharose

Drill citron menthe, pastille à sucer,

Saccharose

Drill miel rosat, pastille à sucer,

Saccharose

Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt.

Aspartam (source de phénylalanine).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Ces médicaments contiennent de la chlorhexidine et un anesthésique local. D'autres médicaments en contiennent ... Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Titulaire et exploitant :

Laboratoires Pierre Fabre Médicament

45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne - France

Commercialisé par Pierre Fabre Santé

Fabricant : Pierre Fabre Médicament Production

45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne - France

• Comment prendre

Drill, pastille à sucer

Drill citron menthe, pastille à sucer

Drill miel rosat, pastille à sucer

Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Les prises doivent être espacées d'au moins 2 heures.

Adultes : 1 pastille à sucer, 4 fois par 24 heures.

Enfants de 6 à 15 ans : 1 pastille à sucer 2 à 3 fois par 24 heures.

Voie orale. Sucer lentement les pastilles sans les croquer, à distance des repas. Si vous avez l'impression que l'effet de ces médicaments est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

• Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Ces médicaments peuvent, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Eruptions cutanées : dans ce cas arrêtez le traitement.

- Possibilité d'engourdissement passager de la langue.

- En cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers"), il est conseillé d'interrompre le traitement et demander l'avis d'un médecin.

- Une coloration brune de la langue ; elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement.

- Une coloration des dents peut également survenir ; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

• Comment conserver ce médicament ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ces médicaments sont sensibles à l'humidité, conserver les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Drill, pastille à sucer

médicament autorisé n° 313.257.0, boîte de 24 pastilles

Drill citron menthe, pastille à sucer

médicament n° 335.882.5, boîte de 24 pastilles

Drill miel rosat, pastille à sucer

médicament n° 335.006.0, boîte de 24 pastilles

Drill sans sucre, pastille à sucer édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt

médicament autorisé n° 333.781.7, boîte de 24 pastilles

Code 710 925



Pierre Fabre

Ces médicaments sont des spécialités d'**Automédication** destinées à être utilisées sans consultation ni prescription d'un médecin. La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical. Veuillez lire attentivement la notice car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

• Drill, pastille à sucer

Les substances actives sont :

• *Gluconate de chlorhexidine 3 mg*

• *Chlorhydrate de tétracaine 0,2 mg*

Les autres composants sont : acide ascorbique, arôme coquelicot (alcoolats de cerise et de framboise ; alcoolatures de cerise, de framboise, de bourgeons de cassis, de cassis fruit, vanille ; huiles essentielles dont amande amère, lie de vin, orange, rose ; hyperconcentrés aromatiques tels que absolues et concrètes, parmi lesquels vanille, jasmin, iris, feuilles de violette, saccharose), arôme pulmoral (menthol, huile essentielle d'eucalyptus, thymol, terpinéol), glycyrrhizate d'ammonium, rouge cochenille A, glucose anhydre, saccharose. Pour une pastille de 2,5 g.

• Drill citron menthe, pastille à sucer

Les substances actives sont :

• *Gluconate de chlorhexidine 3 mg*

• *Chlorhydrate de tétracaine 0,2 mg*

Les autres composants sont : ascorbate de sodium, saccharose, glucose liquide, glycyrrhizinate d'ammonium, acide tartrique, arôme citron (citral, citronellal, géraniol, huiles essentielles d'orange, de citron, de verveine, de géranium, d'limonène, linalol, alpha-pinène, bêta-pinène, terpinolène), arôme menthe (acétates d'éthyle, d'hexyle, d'isoamyle, de benzyle, de cishexényle, acide méthyle-2 valérique, anéthole, butyrate d'éthyle, 1-carvone, formiate d'anisyle, formiate d'éthyle, cis-hex-3-ene-1-ol, huiles essentielles d'eucalyptus, de menthe crépue, de menthe poivrée, 4-hydroxy-2, 5-diméthyl-3 (2H) furanone, PG p-hydroxyphénylbutanone, bêta-ionone, menthol, 1, 15-pentadécalactone, propionate d'isoamyle, propylène glycol, rose absolute, 1- (2, 6, 6 triméthyl-cyclohex-1-enyl)-but-2-énone, 3-hydroxy-2-méthyl-4-pyrone), jaune de quinoléine. Pour une pastille de 2,5 g.

• Drill miel rosat, pastille à sucer

Les substances actives sont :

• *Gluconate de chlorhexidine 3 mg*

• *Chlorhydrate de tétracaine 0,2 mg*

Les autres composants sont : ascorbate de sodium, saccharose, glucose liquide, miel blanc, glycyrrhizinate d'ammonium, extrait de réglisse sec, arôme naturel de rose (huile essentielle de rose, alcool). Pour une pastille de 2,5 g.