

PEPSANE® GEL BUVABLE

GAÏAZULÈNE, DIMÉTICONE

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

■ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION

PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose.

COMPOSITION

Gaïazulène..... 0,004 g

Diméticone..... 3,000 g

Excipients : sorbitol à 70% (crystallisable), carraghénates, cyclamate de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), huile essentielle de menthe poivrée, eau purifiée.

Pour un sachet-dose de 10 g.

FORME PHARMACEUTIQUE

Gel buvable en sachet-dose. Boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTIACIDE - ANTIFLATULENT

(A : Appareil digestif et métabolisme).

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU FABRICANT

Titulaire de l'AMM : Laboratoires ROSA PHYTOPHARMA
68, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 PARIS - FRANCE.

Exploitant de l'AMM / Fabricant :

Laboratoires ROSA PHYTOPHARMA
2, avenue du Traité de Rome - B.P. 51
78401 CHATOU CEDEX - FRANCE.

■ DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement des maux d'estomac.

■ ATTENTION !

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Sorbitol (1g par sachet), parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

■ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale : absorber directement le contenu d'1 ou 2 sachets-dose, 2 à 3 fois par jour, au moment des douleurs.

■ EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant.

■ CONSERVATION

- NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :
à conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

■ DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Juin 1999.



Laboratoires ROSA PHYTOPHARMA - 68, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 PARIS - FRANCE
Information médicale : +33 (0) 1 34 80 72 60

7089670 - 402935