

Xolaam

Hydroxydes d'aluminium et de magnésium

Comprimé à croquer ou à sucer

▼ COMPOSITION - PRÉSENTATION :

Aluminium (gel d'hydroxyde)

quantité correspondant à aluminium (hydroxyde) 400 mg

Magnésium (gel d'hydroxyde)

quantité correspondant à magnésium (hydroxyde) 400 mg

pour un comprimé à croquer ou à sucer.

Excipients : mannitol, sorbitol, saccharine sodique, saccharose pulvérisé amylicé, arôme menthe en poudre, stéarate de magnésium, saccharose pour compression directe.

Boîte de 40 comprimés.

Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-ACIDE - (Classe A : Appareil Digestif et Métabolisme).

Nom et adresse de l'exploitant : Laboratoire RPG

Ranbaxy Pharmacie Génériques - 11-15 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux

Fabricant : Delpharm Evreux - 27000 Evreux

▼ INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Ce médicament est indiqué dans les douleurs, brûlures ou aigreurs de l'estomac ou de l'œsophage.

▼ ATTENTION !

Contre-indications :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin.

Si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter immédiatement votre médecin.

En raison de la présence de sorbitol et de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire), de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi :

Si vous suivez un régime limité en hydrate de carbone, régime sans sucre ou régime diabétique, tenir compte de l'apport en sucres (10 mg de mannitol, 125 mg de sorbitol et environ 250 mg de saccharose) par comprimé.

En cas de dialyse rénale chronique ou de traitement prolongé, tenir compte de l'apport en aluminium.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN

OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'anti-acide et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'anti-acide (par exemple 2 heures avant).

Grossesse - Allaitement :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'UNE FACON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Liste des excipients ayant un effet notoire :

Sorbitol, saccharose.

▼ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie :

1 à 2 comprimés à prendre au moment des douleurs, chez l'adulte.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être sucés ou croqués.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

Ce médicament doit être pris au moment des douleurs sans dépasser 6 prises par jour.



▼ EFFETS INDÉSIRABLES :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses, une diminution du taux de phosphore dans le sang peut survenir.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

▼ CONSERVATION :

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

82251B00

Xolaam, comprimé à croquer ou à sucer

Janvier 2006