

Rennie®

Déflatine®

comprimé à croquer



Carbonate de calcium, Carbonate de magnésium, Diméticone

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent au-delà de 10 jours de traitement, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?
3. Comment prendre RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIACIDE.
Ce médicament est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 15 ans en cas de brûlures d'estomac (excès d'acidité gastrique) associées à des ballonnements.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans Rennie Déflatine,
- En cas de maladie rénale (défaillance des fonctions du rein) du fait de la présence de carbonates de calcium et de magnésium,
- En cas d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer :

Mises en garde spéciales

Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :

- Si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- Si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- Si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- Si vous souffrez d'une maladie des reins.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Précautions d'emploi

Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Ce médicament contient des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Ce médicament peut diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment ce médicament et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Grossesse et allaitement

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer :

Excipient à effet notoire : sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?

Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie habituelle par 24 heures est de 1 à 2 comprimés à sucer ou à croquer, 2 à 3 fois par jour au moment des douleurs.



80743920/1011FR



Ne pas dépasser 7 comprimés par jour.
Si vous avez l'impression que l'effet de RENNIE DEFLATINE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.
Sucez ou croquez les comprimés.

Fréquence d'administration

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours. En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

Si vous avez pris plus de RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Si vous oubliez de prendre RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de troubles digestifs (diarrhées),
- A doses fortes et prolongées, survenue possible d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), de calculs et troubles rénaux graves,

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer ?

Les substances actives sont :

Carbonate de calcium	680 mg
Carbonate de magnésium lourd	80 mg
Diméticone activé (Silbione Antimousse) ⁽¹⁾	25 mg

Pour un comprimé à croquer.

Les autres composants sont :

Sorbitol, talc, amidon de maïs pré-gélatinisé, amidon de pomme de terre, stéarate de magnésium, arôme menthe ⁽²⁾, arôme citron ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Diméticone activé (Silbione Antimousse) : polydiméthyl-siloxane activé par la silice.

⁽²⁾ Composition de l'arôme menthe : mélange d'huiles essentielles de Mentha piperita-dextrine.

⁽³⁾ Composition de l'arôme citron : huiles essentielles partiellement déterpénées-dextrine.

Qu'est ce que RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer. Boîte de 18.

Titulaire / Exploitant

BAYER SANTÉ FAMILIALE

33, rue de l'industrie
74240 Gaillard - France

Fabricant

DELPHARM GAILLARD

33, rue de l'industrie
74240 Gaillard - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 3 janvier 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac associés à des ballonnements.
Les brûlures d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...).
N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.
Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :


- Évitez les repas abondants et riches en graisses,
- Évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- Variez votre alimentation,
- Mangez lentement,
- Normalisez votre poids et faites de l'exercice,
- Évitez la pratique d'un effort important juste après le repas,
- Évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Bayer

 Bayer Santé Familiale cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Bayer Santé Familiale participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuses de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Bayer Santé Familiale vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.