

Polysilane[®]

Delalande

Siméthicone, oxyde d'aluminium hydraté

sanofi aventis

comprimé à croquer ou à sucer

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition

Siméthicone (diméthicone additionnée de 4 à 8 % de silice colloïdale).....250 mg

Oxyde d'aluminium hydraté.....500 mg

Excipients : sorbitol, talc, polyvidone, silice colloïdale anhydre, huile essentielle de menthe poivrée, menthol, saccharose, pour un comprimé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé à croquer ou à sucer (Boîte de 32).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIACIDES.

(A : voies digestives et métabolisme).

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

21800 Quétigny – France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un antiacide. Il diminue l'acidité de l'estomac.

Ce médicament est préconisé dans les douleurs, brûlures, aigreurs de l'estomac et dans les ballonnements intestinaux.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ne prenez jamais Polysilane Delalande, comprimé à croquer ou à sucer si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans Polysilane Delalande, comprimé à croquer ou à sucer.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

Si les troubles ne disparaissent pas en une dizaine de jours, si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, IL CONVIENT DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsion chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (cf. rubrique « Posologie »).

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient 1,082 g de saccharose par comprimé dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. Il contient également du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au saccharose ou au sorbitol (maladie héréditaire rare).

Précautions d'emploi

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, de maladie rénale ou de dialyse chronique DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

Éviter le tabac, les boissons alcoolisées, les repas trop épicés, le stress, certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires) pouvant entraîner des brûlures ou aigreurs d'estomac.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures minimum entre l'antiacide et un autre médicament.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Grossesse – Allaitement

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Saccharose, sorbitol, dérivés terpéniques.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Croquer ou sucer 2 à 6 comprimés par jour.

Il est habituellement inutile de dépasser cette posologie. Si celle-ci ne suffit pas à vous calmer, CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :

- risque de convulsions chez l'enfant et chez le nourrisson,
- possibilité d'agitation, de convulsions chez les sujets âgés.



Possibilité de diminution de la quantité de phosphore dans l'organisme en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Juin 2010.