

GAVISCON

Suspension buvable en sachet

Alginate de sodium / Bicarbonate de sodium

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que GAVISCON, suspension buvable en sachet et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GAVISCON, suspension buvable en sachet ?
3. Comment prendre GAVISCON, suspension buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GAVISCON, suspension buvable en sachet ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GAVISCON, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIREFLUX

ANTIACIDE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans les brûlures d'estomac (pyrosis) les remontées ou renvois acides et les aigreurs d'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GAVISCON, suspension buvable en sachet ?

Précautions d'emploi :

Faites attention avec GAVISCON, suspension buvable en sachet

En cas de régime sans sel, ou pauvre en sel, tenir compte de l'apport de sodium (145 mg par sachet)

Parallèlement à l'emploi de ce médicament, il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno-diététiques :

- Éviter de se coucher immédiatement après le repas
- Ne pas dormir à plat (surélever la tête du lit pour diminuer la fréquence du reflux nocturne)
- Éviter les travaux prolongés, buste penché en avant (ménage, jardinage...)
- Éviter les repas trop abondants

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les anti-acides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre l'anti-acide et un autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse et l'allaitement, si besoin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de GAVISCON, suspension buvable en sachet

Liste des excipients à effet notoire : Sel de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216)

3. COMMENT PRENDRE GAVISCON, suspension buvable en sachet ?

Posologie

1 sachet 3 fois par jour après les principaux repas et éventuellement le soir au coucher.

Cette posologie peut être doublée en cas de reflux ou d'inflammation oesophagienne sévères.

Mode d'administration

Ce médicament doit être pris par voie orale.

Malaxer le sachet avant ouverture.

Fréquence d'administration

Ce médicament doit être pris après les repas.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GAVISCON, suspension buvable en sachet est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.



- Constipation éventuelle
- En cas d'utilisation prolongée, risque d'augmentation du taux de calcium dans le sang.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GAVISCON, suspension buvable en sachet ?

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser GAVISCON, suspension buvable en sachet après la date de péremption mentionnée sur le sachet.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Boîte de 24 sachet-dose de 10 ml.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GAVISCON, SUSPENSION BUVABLE EN SACHET ?

Les substances actives sont :

Alginat de sodium..... 500 mg

Bicarbonate de sodium..... 267 mg

Pour un sachet

Les autres composants sont :

Carbonate de calcium, carbomère (974P), saccharine sodique, arôme menthe naturelle, hydroxyde de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), eau purifiée.

Qu'est ce que GAVISCON, suspension buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Boîte de 24 sachet-dose de 10 ml.

Titulaire

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

DANSOM LANE

HU8 7DS HULL

Royaume-uni



Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

15, RUE AMPERE

91748 MASSY CEDEX,

FRANCE –

TEL : 01.69.93.17.00

Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD

KINGSTON WORKS

DANSOM LANE

HULL

EAST YORKSHIRE HU8 7DS

ROYAUME-UNI

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 10 avril 2007.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

GAVISCON et le symbole  sont des marques déposées.

CONSEILS/ EDUCATION SANITAIRE

MAUX D'ESTOMAC

ANTIACIDE SEUL

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

- Evitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,
- Evitez les repas abondants et riches en graisses,
- Mangez lentement,
- Evitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- Variez votre alimentation,
- Normalisez votre poids,
- Evitez la pratique d'un effort important juste après le repas.